


[H] Chinese

Vol. V

5

V. 11 - V. 13





尚德按全  
有方九首

尚德按今  
有方五首

尚德按今有方五首

尚德按今有方五首

尚德按今  
有菜等二

十六件  
尚德按附  
字下是免

字下疑脫  
之字

唐王壽先生外臺祕要方卷十一目錄消渴消中十八門

消渴方一十七首

近效極要熱中小便多漸瘦方四首

消渴口乾燥方三首

睡中尿牀不自覺方六首

渴後恐成水病方三首

强中生諸病方六首

卒消渴小便多太數方八首

將息禁忌論一首

敎菜等二十二件

近效極要消渴方二首

渴利虛經脈澀成癰膿方一十一首

消中消渴腎消方八首

渴後小便多恐生諸瘡方二首

虛勞小便白濁如脂方四首

消渴不宜鍼灸方一十首

近效祠部李郎中消渴方二首

敍魚肉等一十五件

敘米豆等九件



喜王族



唐王素先生外臺祕要方卷十一

宋朝散大夫守光祿卿直祕閣判登聞鼓院上護軍臣林億等上進

新 安 後 學 程 行 道 敬 通 父 訂 梓

消渴方一十七首

通按使音  
安也靜也  
宋本五作  
止止作為

病源夫消渴者渴而不小便是也由少服五石諸丸散積久經年石勢結於腎中使人下焦虛熱及至年  
衰血氣減少不能制于石石勢獨盛則腎為之燥故引水而不小便也其病變者多發癰疽此坐熱氣留  
於經絡經絡不利血氣壅滯故成癰膿也診其脈數大者生細小浮者死又沈小者生實牢大者死有病  
口甘者名為何何以得之此五氣之溢也名曰脾瘴夫五味入於口藏於胃脾為之行其精氣溢在於脾  
令人口甘此肥美之所發也此人必數食甘美而多肥肥令人內熱甘者令人中滿故其氣上溢為消渴  
也厥陰之為病消渴氣上衝心中疼熱肌不欲食甚者則欲吐下之不肯止養生法云人睡卧勿張口久  
成消渴及失血也赤松子云卧閉目不息十二通治飲食不消其湯飲銀石別有正方補養宣導令附於  
後法云解衣使卧伸腰腹少腹五息止引腎去消渴利陰陽解衣者使無坐礙使卧者無外想使氣易行  
伸腰者使腎無逼臆腹者大努使氣滿少腹者攝腹牽氣使五息即止之引腎者引水來咽喉潤上部去  
消渴枯槁病利陰陽者饒氣力也出第五卷通按後條古人喜石宜消渴今服石者少何有此症緣酒  
多令中三焦熱臍脾亦致消渴不必皆由服石也但治法頗同  
千金論曰夫消渴者凡積久飲酒無有不成消渴病者然則大寒凝海而酒不凍明其酒性酷熱物無以  
加脯炙鹽鹹此味酒客多嗜不離其口三觴之後制不由已飲噉無度咀嚼酢醬不擇酸鹹積年長夜酣  
興不懈遂使三焦猛熱五藏乾燥木石猶且焦枯在人何能不渴療之愈否屬在病者若能如方節慎旬  
月而瘳不自愛惜死不旋踵方書醫藥實多有效其如不慎者何其所慎者有三一飲酒二房室三鹹食  
及麪能慎此者雖不服藥而自可無他不知此者縱有金丹亦不可救深思慎之深思慎之凡消渴之人  
愈與未愈常須慮患大癰何者消渴之人必於大骨節間忽發癰疽而卒所以戒在大癰也當預備癰藥



通接近效

渴後飲

嘔逆成

忍成難

水病亦

此方

尚德按

金無地

皮用枸

子十分

又按得

下子金

尚德按

金生麥

冬汁二

尚德按

金茯苓

二兩知

三兩

又按及

金作八

尚德按

以防之宜服麥門冬丸除腸胃熱實兼消渴方 麥門冬去心茯苓去白黃連 石膏碎黃蘗各八分人參

龍膽 黃芩各六分升麻四分栝蒌一分枳實五分生薑屑十分地骨皮六分茅根切一粟米合右十五味以水

六升煮茅根及粟米令爛餘十三味搗末蜜和丸如梧子以前茅根粟米汁作飲服十九日二若渴則

與此飲至足大麻亦得忌猪肉酢物

又栝蒌湯方 栝蒌五兩麥門冬汁三升生薑五兩茅根切三升蘆根切二右五味以水一斗煮取三升分

為三服忌如藥法

又胃腑實熱引飲言渴茯苓湯洩熱止渴方 茯苓一作栝蒌各五知母四小麥二麥門冬五兩大棗十二

枚去生地黃六兩姜桂四兩淡竹葉三升右九味切以水三斗先煮小麥竹葉取九升去滓內諸藥煮取四

升分四服不問早晚隨渴即進非但正治胃渴通治渴病熱即服之忌蕪荑酢物

又猪肚丸療消渴方 猪肚一治黃連五兩栝蒌 麥門冬去心知母 茯苓各四梁米五兩右七味搗

為散內肚中線縫安置甑中蒸之極爛熟接熟及藥木白中搗可堪丸若硬加少蜜和丸如梧子飲汁

下三十九日再服漸加至四五十丸渴即服之同

又栝蒌散方 栝蒌八分麥門冬去心甘草六分鉛丹八分右四味搗為散以漿水服方寸匕日三服忌海藻

菰菜一方有茯苓

又黃耆湯方 黃耆 茯苓 栝蒌 甘草炙麥門冬去心各五兩 乾地黄五兩右六味切以水八升煮取二

升半分三服忌蕪荑酢物海藻菰菜日進一劑服十劑訖服丸藥後腎消門中宣補丸是

又方 取七家井索近桶口結處燒作灰 右一味以井華水服之不過三服

又方 飲鼓汁任性多少差止

又方 濃煮竹根汁飲之取差止肘後

又方 煮青梁米汁飲之差止肘後



尚德按千金石草人  
四兩附子  
三兩無遠  
三兩有從容  
四兩石斛  
作石膏白  
蜜二升  
蜜二升

又消渴陰脈絕胃反吐食方 茯苓八兩澤瀉兩四 白朮 生薑 桂心各三兩 甘草炙一兩 右六味切以水一

斗煮小麥三升取五升去滓內茯苓等煮取二升半一服八合日再同

又方 取屋上瓦三十年者破如雀頭三大升以東流水兩石煮取二斗 乾地黄 生薑各八兩 橘皮

甘草炙人參 黃耆各三兩 桂心二兩 遠志三兩 當歸 芍藥各二兩 大棗二十枚 白朮八兩 右十二味切內瓦

汁中煮取三升分溫四服單瓦汁亦佳甘草一方無

又療熱病後虛熱渴四肢煩疼方 葛根一斤 人參 甘草炙各一兩 竹葉把 右四味切以水一斗五升煮取

五升渴則飲一升日三夜二忌海藻松菜

又虛熱渴無不效填骨煎方 茯苓 兔絲子 山茱萸 當歸各三兩 大豆黃卷升 石葦二兩 牛膝 巴

戟天 麥門冬去心各三兩 天門冬去心五兩 五味子三兩 人參二兩 遠志三兩 桂心 附子炮各三兩 石斛三兩 右十六

味先搗篩別取生地黃十斤生栝蓰十斤春絞取汁於火上煎之減半便作數分內藥并下白蜜二升

牛髓一升微火煎之令如糜食如雞子黃大日三亦可飲服之佳忌酢物鯉魚生葱猪肉冷水一方有

兩四

又方 桃膠如彈丸含之咽津甚佳本方療渴小便利復非淋

又方 蠟如雞子大酢一升煮兩沸適寒溫頓服之本方療渴小便利復非淋而且長不吐淋虛之滴瀝也故曰復非淋

又方 水和栝蓰散服方寸匕亦可蜜丸如梧子服三十丸日再服無所忌並出第二十一卷中

近效極要消渴方二首

近效極要論消渴舊來以為難療古方有黃連湯牛膽丸為勝亦不能好差自作此方以來服者皆差服

多者即吐水豈有更渴之理

又療消渴麥門冬丸方 麥門冬五兩 乾地黄三兩 蜀升麻 黃芩各五兩 栝蓰七兩 苦參八兩 人參三兩 黃連 黃

柏各五兩 右九味末之以牛乳和眾手捻作丸子暴乾以飲服二十丸日二加至五六十丸忌蕪荑猪



黃連上宋  
本有宣州  
二字

地骨皮宋  
本作生枸  
杞根

尚德按服  
服千金作  
又按九房  
千金作九  
房  
方字上宋  
本有秘字

肉冷水

又方 黃連<sup>五兩</sup>苦參<sup>一斤</sup>知母<sup>五兩</sup>栝實<sup>二兩</sup>麥門冬<sup>去心</sup>牡蠣粉<sup>各</sup>人參<sup>黃耆</sup> 乾地黄<sup>各五兩</sup> 右九味末之  
以牛乳丸清漿服二十九日二服加至五十九丸忌猪肉冷水蘆薈

近效極要熱中小便多漸瘦方四首

近效極要論熱中雖能食多小便多漸消瘦方 地骨皮<sup>切</sup>一麥門冬<sup>三兩</sup>黃連<sup>二兩</sup>小麥<sup>八兩</sup>人參<sup>兩</sup> 右

五味切以水九升煮取三升八合去滓分為三服間食服之如不能多服分作四五服亦得忌猪肉

又方 人參<sup>五兩</sup>麥門冬<sup>去心</sup>牡蠣粉<sup>各</sup>乾地黄<sup>切</sup>知母<sup>各</sup>苦參<sup>八兩</sup>黃連<sup>栝實</sup>各<sup>八兩</sup> 右八味末之以

生牛乳為丸如梧子清漿服十五丸日再加至四十九丸食後服忌蘆薈猪肉冷水

又療小便多或不禁方 兔絲子<sup>兩</sup>蒲黃<sup>黃連</sup> 硝石<sup>各三兩</sup>肉苁蓉<sup>兩</sup> 右五味兼雞腔脰中黃皮三

兩為散服服方寸匕日三服如行五里久又一服末有不差者忌猪肉<sup>千金名</sup>

又療小便數多不足日便一二斗或如血色方 麥門冬<sup>八兩</sup>蒺藜子<sup>三兩</sup>甘草<sup>一兩</sup>乾薑<sup>四兩</sup>桂心<sup>二兩</sup>乾

地黄<sup>兩</sup>續斷<sup>兩</sup> 右七味切以水一斗煮取二升五合分為三服忌海藻松菜生葱蘆薈<sup>古今錄驗癰</sup>

<sup>似小便數赤色</sup>  
<sup>血虛冷者</sup>

渴利虛經脈證成癰腫方一十一首

病源夫渴利者隨飲小便是也由少服乳石石熱感時房室過度致令腎氣虛耗下焦生熱熱則腎燥腎

燥則渴然腎虛又不能傳制水液故隨飲小便也其病變多發癰疽以其內熱而小便利故也小便利則

津液竭津液竭則經絡澀經絡澀則榮衛不行榮衛不行則熱氣留滯故成癰腫也<sup>此第五</sup>

千金療下焦虛熱注脾胃從脾注肺好渴利方 小麥<sup>升</sup>竹葉<sup>升</sup>麥門冬<sup>去心</sup>茯苓<sup>各四兩</sup>甘草<sup>三兩</sup>大棗<sup>十</sup>

<sup>枚</sup>生薑<sup>各五兩</sup>栝實<sup>兩</sup>地骨皮<sup>升</sup> 右九味切先以水三斗煮小麥取一斗去滓澄清取八升去上沫

取七升煮藥取三升分三服忌海藻松菜酢物



又療渴利虛熱引飲不止消熱止渴茯苓湯方 茯苓<sub>四兩</sub>石膏<sub>八兩</sub>地骨皮<sub>升</sub>竹葉<sub>三升</sub>栝婁<sub>五兩</sub>萎蕤<sub>四兩</sub>麥冬<sub>四兩</sub>

為四服忌煎炙

先食後服如雞子大日三服

又療瀉小便利復非淋方 榆白皮二斤皮切 右一味以水一斗煮取五升 服三合日三服

又方 小豆藿一把 搗取汁頓服日三  
仲夏同

又療虛熱四體羸瘦濕熱不止茯神消濕補虛者散方 茯神兩石斛兩枳實兩甘草五兩五味子兩

三升煮又十兩之量一日再一食為一段  
者同昔力每藥出第二十

答兩知母兩黃連兩丹麥兩人參當歸兩  
小蓰升姜蒜雨右十三味搗篩為散取三寸七以水

三升者取一升，以袋盛，煮之，日再一煮，服一服，忌食肉、醢、物、酒、葷菜。第一卷中。

壽筭萬數以并凡和并手念爲凡如吾子大暴乾日再服飽食訖以髓水下之服二十凡如微利減十

凡如食麪酒等即加服五丸出第三卷中

廣濟療脾胃中虛熱消渴小便數骨肉日漸消瘦方  
麥門冬十二分 苦參 栝實 知母 茯神 土

瓜根各八分甘草炙人參各六分右八味搗篩蜜和丸每食少時意蘆根大麥飲服如梧子二十九日再

漸加至三十九忌海藻菰菜猪肉大酢

時後療消渴肌膚羸瘦或虛熱轉筋不能自止小便數方 栝蒌 黃連 漢防己 鉛丹各分六 右四

味搗篩為散每食後取酢一合水二合和服方寸匕日三服當強飲水須臾惡水不復飲矣

尚德按字  
尚德按字  
金德按字  
金德按字  
以水五斗  
煮取三斗  
三升金作  
尚德按日  
暴二字于  
金作曝字  
尚德按右  
軒生干金  
本同  
又按小麥  
千金作麥  
藥  
苦冬下宋  
宋本有粉  
六味並大  
兩各別搗  
篩為散和  
量減之搗  
餅攪使勻  
以牛乳云



翼同分兩小劑  
出第十卷中

消渴口乾燥方三首

廣濟瘰癧口乾數飲水腰脚弱膝冷小便數用心力即煩悶健忘方 麥門冬去心十二分 牛膝六分 龍骨 土瓜

根各八狗脊 茯神 人參各六分 黃連一分 牡蠣六分 山茱萸八分 兔絲子十二分 酒 鹿茸八分 右十二

味搗篩為末蜜和丸每服食後煮麥飲服如梧子二十九日二服漸加至三十九忌生菜麴猪牛肉蒜

粘食陳臭酢物等

又療消渴口苦舌乾方 麥門冬五兩 茅根一兩 栝婁三兩 烏梅十兩 小麥二升 竹茹一升 右六味以水九

升煮取三升去滓細細含咽分為四五服忌麴炙肉並出第

千金口含酸棗丸療口乾方 酸棗一升 石榴子五合 葛根三兩 烏梅五十顆 麥門冬四兩 茯苓三兩 覆

盤子三兩 桂心三兩 石蜜四兩 栝婁半兩 右十味搗篩蜜和為丸含如酸棗許大不限晝夜常令口中

有津液出為佳忌大酢生葱翼同出第

消中消渴腎消方八首

病源內消病者不渴而小便多是也由少服五石熱結於腎內熱之所作也所以服石之人小便利者石

性歸腎腎得石則實實則消水漿故利利多則不得潤養五臟藏衰則生諸病焉由腎盛之時不惜真氣

恣意快情數使虛耗石熱孤盛則作消中故不渴而小便多也出第

千金論曰夫內消之為病當由熱中所作也小便多於所飲令人虛極短氣又內消者食物皆消作小便

而又不渴正觀十年梓州刺史李文博先服白石英久忽然房道強盛經月餘漸患渴經數日小便大利

日夜百行以來百方療之漸以增劇四體羸瘦不能起止精神惺恍口舌焦乾而卒此病雖稀甚可畏也

利時脈沉細微弱服栝湯即效若恐不能長愈服鉛丹散立效其間將服除熱宣補丸栝湯方 栝

枝葉一斤 栝葉根 石膏 黃連各三兩 甘草二兩 右五味切以水一斗煮取三升去滓分溫五服日

忌字上宋  
本有不利  
二字

尚德按十  
金烏梅十  
枚桂心一  
兩六錢  
又按盤干  
金作盆  
尚德按今  
有方九首

尚德按德  
悅十金作  
悅德  
尚德按十  
金甘草三



兩

尚德按千  
金八味各  
五分

尚德按千  
金鹿按千  
三合從蓉  
六兩半根  
汁作菲根  
湯日字下  
有服二  
尚德按千  
金鹿按千  
各二兩

尚德按千  
金阿膠二  
挺  
又按千金  
無人參甘  
草止五味  
尚德按千

三夜二服困重者多合湯即飲之忌海藻松菜猪肉

又鉛丹散主消渴止小便數兼消中悉主之方 鉛丹二分 枳實根二分 甘草十分 澤瀉五分 胡粉二分 研入

石膏研 白石脂研 赤石脂各五 右八味搗研為散水服方寸匕日三服少壯人一匕半患一年者服

之一日差二年者二日差渴甚者夜二服若腹中痛者減之丸服亦佳服十丸以差為度不要傷多

令人腹痛此方用之如神已用經今三十餘載矣忌海藻松菜文仲云腹中痛者宜漿水飲汁下之亦

得又備急云不宜酒下用麥汁下之亦得丸服者服十丸日再服合一劑救數人得愈古今錄驗云服

此藥了經三兩日宜爛煮羊肝肚空腹喫之或作羹亦得宜湯羹食之候小便得鹹苦即宜服後從從

蓉丸兼煮散將息

又療腎消渴小便數宜補丸方 黃耆 枳實 麥門冬去心 茯苓 人參 甘草炙 黃連 知母各三

地黃 石膏研 各兔絲三兩 肉蓯蓉四兩 右十二味末之以牛膽汁三合共蜜和丸梧子大以茅根汁服

三十九日漸加至五十九一名茯苓丸同集驗

又療腎氣不足虛損消渴小便數腰痛宜服腎瀝湯方 羊腎一具去脂 遠志去心 人參 澤瀉 乾地黄

桂心 當歸 龍骨 甘草炙 麥門冬去心 五味子合 茯苓各二兩 芍藥二兩 黃芩二兩 生薑六兩 大棗二十枚

右十六味切以水一斗五升煮羊腎取一斗二升內藥取三升分三服忌海藻松菜生葱酢物無美同

又阿膠湯療之虛熱小便利而多或服石散人虛熱多由汗出當風取冷患脚氣喜發動兼消渴腎消服

細弱服此即立減方 阿膠三兩 乾薑二兩 麻子升 遠志去心 附子炮 人參各一兩 甘草三兩 右七味切以水

七升煮取二升半去滓內膠令烱分三服說云小便利多白日夜數十行至一石令五日服之甚良忌

海藻松菜豬肉冷水

又腎消夜尿七八升方 鹿角一具 令炙 右一味搗篩酒服方寸匕漸漸加至一匕半



金服五分  
七日三劑  
加至方寸

通按無脂  
當作有脂

尚德按  
疑當作金

蕪美

又黃耆湯主消中虛勞少氣小便數方 黃耆 芍藥 生薑 當歸 桂心 甘草各二大棗三十枚  
門冬心法乾地黄 黃芩各一兩 右十味切以水一斗煮取三升去滓空腹溫分三服忌海藻松菜生葱

古今錄驗論消渴病有三一渴而飲水多小便數無脂似餡片甜者皆是消渴病也二喫食多不甚渴小

便少似有油而數者此是消中病也三渴飲水不能多但腿腫脚先瘦小陰痿弱數小便者此是腎消病

也特忌房勞若消渴者倍黃連消中者倍栝蒌腎消者加芒硝六分服前件栝蒌丹丸得小便鹹苦如常後

忍虛憊者重宜服此化從容丸方 花從容研澤瀉 五味子 紫巴戟天地骨皮各四分磁石研水淘

栝蒌研 右十六味搗篩蜜和丸如梧子以牛乳空腹下二十九日再服忌海藻松菜胡荽蕪美等物

又服前丸渴多者不問食前後服者散方 桑根白皮 薏苡仁各六兩 通草 紫蘇莖葉各四分 五味子六

覆瓿子 枸杞子各八分 乾地黄 茯苓 菟絲子各二分 黃耆一分 右十一味搗以馬尾羅篩之分為五貼

每貼用水一升八合煎取七合去滓溫服忌酢物蕪美出第二十卷中

睡中尿床不自覺方六首

病源夫人有於眠睡中不覺尿出者是其稟育陰氣偏盛陽氣偏虛則膀胱腎氣俱冷不能溫制於水則

小便多或不禁而遺尿膀胱足太陽也為腎之腑腎者足少陰也為藏與膀胱合俱主水凡人之陰陽日

入陽氣盡則陰受氣至夜半陰陽大會氣交則卧睡小便者水液之餘也從膀胱入於胞為小便夜卧則

陽氣衰伏不能制於陰所以陰氣獨發水下不禁故於睡眠而不覺尿床也出第十卷中

肝後瘡少小睡中遺尿不自覺方 取鵲巢中薤白燒水服一錢匕即差文仲方千金同

又方 雄雞肝 桂心 右二味等分搗丸服如小豆一枚日三服

又方 雄雞屎白 桂心 右二味等分末酒服方寸匕日二亦可除桂心



尚德按夏  
疑當作夏

又方 礬石<sup>燒令汁盡</sup>牡蠣<sup>熬</sup> 右二味等分末之以粟米粥飲服方寸匕日三

又方 雄雞喉嚨及矢白脰脰裏黃皮燒末麥粥清盡服之亦可以赤雞翅燒末酒服三指撮日三

又方 薔薇根隨多少剉搗以酒飲之<sup>並出第</sup>

渴後小便多恐生諸瘡方二首

病源渴利之病隨飲小便也此謂服石之人房室過度腎氣虛耗故也下焦生熱熱則腎燥腎燥則渴然

腎虛又不能制水故小便利也其渴利雖差熱猶未盡發於皮膚皮膚先有風濕濕熱相搏所以生瘡也

出第五

近效恐腎虛熱渴小便多除風濕理石毒止小便去皮膚瘡調中方 升麻<sup>四分</sup>玄參<sup>五分</sup>甘草<sup>四分</sup>知母<sup>五分</sup>

茯苓<sup>三分</sup>牡蠣<sup>六分</sup>漏蘆<sup>五分</sup>枳實<sup>六分</sup>葶藶<sup>四分</sup>黃連<sup>六分</sup> 右十味搗篩飲汁服方寸匕日再服以差為度忌

猪肉海藻松菜酢物

又方 栝蓰<sup>各八分</sup>茯苓<sup>各八分</sup>玄參<sup>四分</sup>枳實<sup>六分</sup>苦參<sup>各八分</sup>甘草<sup>各八分</sup>橘皮<sup>各三分</sup>

方寸匕日再服忌海藻大酢松菜 右七味搗篩每空腹以漿水服

渴後恐成水病方三首

病源五藏六腑皆有津液若腑藏因虛實而生熱者熱氣在內則津液竭少故渴也夫渴數飲其人必眩

背寒而嘔者因利虛故也診其脈心脈滑甚為善渴其久病變或發癰疽或為水病<sup>出第五</sup>

近效渴後數飲嘔逆虛羸恐成癰疽水病方 茯苓<sup>五分</sup>栝蓰<sup>六分</sup>升麻<sup>四分</sup>麥門冬<sup>六分</sup>桑根白皮<sup>八分</sup>橘皮<sup>三分</sup>

右六味搗為散清水服一方寸匕日再服忌酢物

又方 人參<sup>各三分</sup>栝蓰<sup>各三分</sup>通草<sup>五分</sup>黃連<sup>六分</sup>麥門冬<sup>六分</sup>栝蓰<sup>各八分</sup>

以差為度忌猪肉冷水生冷等物 右六味搗為散漿水送方寸匕日再服

又若已覺津液竭身浮氣如水病者方 漢防己<sup>各六分</sup>栝蓰<sup>八分</sup>茯苓<sup>四分</sup>桑根白皮<sup>十二分</sup>白朮<sup>三分</sup>杏



虛勞小便白濁如脂方內有

宋本無此  
以下二字

仁去皮郁李仁各六葶藶子十二分 右九味搗篩蜜和丸如梧子空腹漿水服三十九日一服腫消  
小便快下為度忌酢物桃李崔肉等

又葶藶丸療消渴成水病浮腫方 甜葶藶細紙 桔槩仁 杏仁去皮去雙 黃漢防己各一 右四味為末

蜜丸搗二三百杵如梧子大服三十九食前茯苓煎湯送下日三四服

又瞿麥湯療消渴欲成水氣面目并足脰浮腫小便不利方 瞿麥穗 澤瀉 滑石各兩 防己三分 黃芩

大黃各一 桑螵蛸四十枚 右七味切每服三錢匕水三升煮一升去滓空心溫服良久再服

尚德按今  
有方五首

虛勞小便白濁如脂方四首

病源此由勞傷於腎腎氣虛冷故也腎主水而關竅在陰陰為尿便之道胞冷腎損故小便白而如脂或  
如數片也出第四

橘槩五兩  
宋本作五  
大雨

崔氏飲水不知休小便中如脂舌乾渴方 黃連 桔槩各五 右二味搗末以生地黃汁和丸併手丸

每食後牛乳下五十九日再服之忌猪肉

近效消渴肝肺熱焦枯消瘦或寒熱口乾日夜飲水小便如脂不止欲死方 水飛鐵粉三兩 雞肥

胘五枚 牡蠣二兩 黃連三 右四味搗篩三五度鍊蜜和丸飲汁下如梧子大五十九重者不

過食時輕者手下差勿傳忌猪肉

又主消渴口乾方 黃連 豉各令 右二味一處搗令成丸食後飲服四十九日再丸稍大如常藥丸

常服有效忌猪肉

又消渴能飲水小便甜有如脂鉄片日夜六七十起方 冬瓜一枚黃連兩 右截瓜頭去穰入黃連末火

中煨之候黃連熟布絞取汁一服一大盞日再服但服兩三枚瓜以差為度一方云以瓜汁和黃連末

和如梧子大以瓜汁空肚下三十九日再服不差增丸數忌猪肉冷水

經驗用大牡蠣不計多少以臘日端午日將黃泥裹煨通亦放冷取出為末用活鯽魚煎湯調下一錢

宋本黃連  
上有取字  
下有為末  
二字或字  
上有好字  
微字上有  
宋本黃連  
上有為字  
十兩下有  
傳為末三  
字和字下



有凡字

尚德按今有方五首

強中生諸病方六首  
病源夫強中病者莖長興感不痿精液自出是也由少服五石石熱住於腎中下焦虛熱少壯之時血氣尚豐能制於石及至年衰血氣減少腎虛不能制精液也若精液竭則諸病生矣出第五卷中

千金論曰夫人生放恣者最感壯之時不自慎惜快情縱慾極意房中稍至年長腎氣虛竭百病滋生又年少慮不能房多服石散真氣既盡石氣孤立唯有虛耗唇口乾焦精液自洩或小便赤黃大便乾實或渴而且利日夜一石以來或渴而不利或不渴而利所食之物皆作小便此皆由房室不節之所致也又強中之病者莖長興感不痿精液自出也消渴之後即作癰疽皆由石熱凡如此等宜服猪腎薺尾湯制

尚德按接千金作交

尚德按千金人參三

兩碑字下

宋本並有

尚德按無字上千金

有夜字

尚德按仲景無此論

尚德按仲

尚德按千金無大麥

二字參飲

依

猪腎薺尾湯方 猪腎一具去脂 大豆升薺尾兩三人參 茯神 磁石碎 知母 葛根 黃芩 栝蒌

甘草二兩各 石膏三兩 右十二味切以水一斗五升先煮猪腎大豆取一斗以下去滓內諸藥煎取三

升去滓分溫三服渴乃飲之下焦熱者輒合一劑病勢漸歇即停忌海藻菰菜酢物

又平人夏月喜渴者由心王也心王便汗出汗則腎中虛燥故令渴而小便少也冬月不汗出故小便多而數也此皆是平人之候名曰腎渴但小便利而不飲水者名腎實也經曰腎實則消消者不渴而利

是也所以服石之人其於小便利者石性歸腎腎得石則實實則能消水漿故利利多則不得潤養五藏藏衰則生諸病也張仲景曰若熱結中焦則為堅熱也熱結下焦則為溺血亦令人淋閉不通明知不必

悉患小便利信矣內有熱氣者則喜渴也除其熱則止渴兼虛者須除熱而兼宜補虛則病愈

又療嶺南山瘴氣兼風熱毒氣入腎中變成寒熱脚弱虛滿而渴方 黃連多少 生栝蒌汁 生地黃汁 羊

乳無即明牛乳及人乳亦得 右四味取三股汁乳和黃連末任多少服手捻為丸如梧子大麥飲服三十丸漸加

至四十丸五十九日三服輕者三日愈重者五日愈若藥苦難服即煮麥飲汁下亦得文仲云黃連九

一名羊乳丸時後同忌猪肉蠶夷



又療消渴浮萍丸方 浮萍 栝蒌根分等 右二味搗篩以人乳汁和為丸如梧子參飲服二十九日三

服三年病三日差 附後文仲同

又療面黃咽中乾燥手足俱黃短氣脈如連珠除熱止渴利補養地黃丸方 生地黃汁 生栝蒌汁各

升生羊脂 三升牛好蜜四升黃連末一斤 右五味搗合銀鍋中熬成煎可丸如梧子飲汁送五丸日三服

至十九丸若苦冷而渴差即令別服溫藥忌猪肉蕪菜 附後

又療渴小便數散方 知母六栝蒌一斤茯苓四兩鉛丹一分雞臍腔中黃皮 十四 右五味為散飲服方寸匕

日三服酒生菜肉差後去鉛丹以蜜和之以麥飲長服勿絕良忌 酢物同附後

消渴不宜鍼灸方一十首

千金論曰凡消渴病歷百日以上者不得灸刺灸刺則於瘡上漏膿水不歇遂成癰疽羸瘦而死亦忌有

所誤傷皮肉若作鍼孔許大瘡者所飲之水皆於瘡中變成膿水而出若水出不止者必死慎之慎之初

時尚渴者可依後方灸刺之為佳孫氏云消渴病百日外既不許鍼刺所飲之水皆化為膿水不止者皆

死特須慎之又云仍不得誤傷皮肉若有小瘡亦云故此既今亦得消渴且未免飲水水入瘡即增人今

初得日豈得令其灸刺致此誤傷之禍輒將未順且理且取百日以上為能來悟初灸之說故不錄灸刺

凡灸刺則外脫其氣消渴皆是宜灸灸刺特不相宜唯脚氣宜即灸之是以不敢灸者耳又有人患消

渴小便多者數發在於春經一夏專服栝蒌及豉汁得且力渴漸差然小便猶數甚晝夜二十餘行常至

三四升極多不減一升也轉久便止漸食肥膩日就羸瘦脣口乾燥吸吸少氣不得多語心煩熱兩脚酸

食乃艱倍於常而不為氣力者然此病皆由虛熱所為耳療法栝蒌汁可長服以除熱牛乳杏酪善於補

此法最有名 一卷中 文仲療消渴熱中加減六物丸方 栝蒌根八麥門冬六分知母五入參 苦參 土瓜根各四 右藥

搗篩以生膽和為丸如小豆服二十九日三服麥粥汁下未知稍加至三十九丸咽乾者加麥門冬苦乾



尚德按亦  
字上千金  
有食前後  
魚梅五字  
宋本同  
拘作在誤

巳字下宋  
本有不利  
二字  
作字下宋  
本有不利  
二字  
宋本黃連  
上有異字  
日再作每  
一升下宋  
本有異字  
二字

加知母脇下濕加人參小便難加苦參小便數加土瓜根隨處加之一升

又黃連丸主消渴方 黃連去毛生地黄切右二味搗破地黃取汁漬黃連出暴之燥復內之令汁盡

乾漚之下篩蜜和丸如梧子服二十丸日三服亦可散以酒服方寸匕日三服盡更令作即差止忌猪

肉蕪美附使無數十金廣同並出第八卷中

千金栝蒌粉散燈消渴秘方 採大栝蒌根厚削皮至白處 右一味寸切以水浸一日一易經五日

出取爛搗破之以絹袋盛攪之一如出粉法水服方寸匕日三四亦可作粉粥乳酪中食之不限多少

取差止出第二十卷中

肘後主消渴方 秋麻子一升以水三升煮三四沸取汁飲之無限不過五升差文仲同出第二卷中

廣濟療消渴氣散方 栝蒌 石膏研甘草各三兩甘皮二兩右四味搗篩為散食後煮大麥飲服方寸

匕日二夜一服漸加至二匕忌熱海藻菘菜

又療消渴麥門冬湯方 蘆根 苧根各二升切石膏六分生薑 栝蒌各五兩小麥 生麥門冬去心各二升右

七味切以水二升煮取六升去滓一服一升渴即任意飲未差更作出第一卷中

崔氏療患熱消渴常服有驗方 豉心以酸醋拌蒸乾如黃連各三兩右二味搗篩訖以蜜和為丸日再

空腹服二十五丸食後又服二十丸又取烏梅十顆以水二小升煎之數沸取湯下前件丸藥如無烏

梅以小麥子二升煮取汁亦得

又方 黃連一升去毛麥門冬五兩去心右二味搗篩以生地黄汁栝蒌根汁牛乳各三合和頓為丸如梧子一

服二十五丸飲下日再服漸漸加至三十丸若不頓為丸經宿即不相着也消渴及小便多並是虛熱

但冷將息即差前件三方崔氏本方中此處更有一方用栝蒌黃連者故云前件三方並是冷補空腹服恐少腹下冷常喫少許食

服之大好忌猪肉蕪美

又療消渴無此方 土瓜根八兩苦參粉三兩黃連五兩鹿茸炙栝蒌各三兩雄雞腸三兩牡蠣五兩白石脂研甘



尚德按酒千金作消  
宋本同  
又按此方  
又見第三  
十一卷中  
尚德按千  
金云不知  
丸取至七  
已一月云  
云九下家  
本有食上  
飲下四字  
尚德按取  
性飲之者  
理隨酒量  
飲之也

草黃耆各三桑螵蛸三七白龍骨各一斤雞肫腔黃皮具其右一十三味搗篩為散一服六方寸匕

日再服夜一服以後藥下之

竹根十麥門冬各四石膏各四甘草根白皮各三右四味切以水一斗二升煮取三升五合以下前件散

藥如難服可取此藥汁和丸一服六十九丸仍還用此藥汁下之忌猪肉海藻松菜出第四卷中

千金加減巴郡太守奏三黃丸療男子五勞七傷酒渴不生肌肉婦人帶下手足寒熱者方

春三月黃芩兩四大黃三兩黃連兩四夏三月黃芩兩六大黃一兩黃連七兩

秋三月黃芩兩六大黃兩三黃連兩三冬三月黃芩兩三大黃兩五黃連兩二

右三味隨時合搗下篩以蜜和為丸如大豆服五丸日三不知稍增七丸服一月病愈久服走及奔馬

近常試驗忌猪肉一卷中

卒消渴小便多太數方八首

肘後卒消渴小便多方 多作竹瀝飲之通按此口者謂多飲竹瀝非恣食也

又方 酒煎黃柏汁取性飲之通按性飲者若人飲之

又方 熟胡麻令變色研淘取汁飲半合日可三四服不過五升即差

又療日飲水一斛者方 桑根白皮新掘入地三尺者佳炙令黃黑色切以水煮之無多少但令濃隨意

飲之無多少亦可內少粟米勿與鹽其飲之宜

又小便卒太數復非淋一日數十過令人瘦方 未中水猪脂如雞子一枚炙承取肥汁盡服之不過三

劑差

又方 羊肺一具作囊內少肉和鹽豉如食法任意進之不過三具差千金同

又方 豉一升內於鹽中綿裹之以白礬好香半斤置綿上令蒸之三斗米許時即下白礬得消入豉中

出暴乾搗末服方寸匕

又小便數猪肚黃連丸方 猪肚一枚洗黃連末三斤内猪肚中蒸之一石米熟即出之暴乾搗丸如梧子服三十丸日再服漸漸加之以差為度忌猪肉出第二卷中

近效祠部李郎中消渴方二首

論曰消渴者原其發動此則腎虛所致每發即小便至甜醫者多不知其疾所以古方論亦闕而不言今略陳其要按洪範稼穡作甘以物理推之淋錫醋酒作脯法須臾即皆能甜也足明人食之後滋味皆甜流在膀胱若腰腎氣盛則上蒸精氣氣則下入骨髓其次以為脂膏其次為血肉也其餘別為小便故小便色黃血之餘也驗氣者五藏之氣鹹潤者則下味也腰腎既虛冷則不能蒸於上穀氣則盡下為小便者也故甘味不變其色清冷則肌膚枯槁也猶如乳母穀氣上洩皆為乳汁消渴疾者下洩為小便此皆精氣不實於內則便羸瘦也又肺為五藏之華蓋若下有暖氣蒸即肺潤若下冷極即陽氣不能昇故肺乾則熱故周易有否卦乾上坤下陽阻陰而不降陰無陽而不昇上下不交故成否也譬如釜中有水以火煖之其釜若以板蓋之則煖氣上騰故板能潤也若無火力水氣則不上此板終不可得潤也火力者則為腰腎強盛也常須煖將息其水氣即為食氣食氣若得暖氣即潤上而易消下亦免乾渴也是故張仲景云宜服此八味腎氣丸並不食冷物及飲冷水令亦不復渴此頻得效故錄正方於後耳凡此疾與脚氣雖同為腎虛所致其脚氣始發於二三月或於五六月衰於七八月凡消渴始發於七八月或於十一月十二月衰於二月三月其故何也夫脚氣者擁疾也消渴者宣疾也春夏陽氣上故擁疾發即宣疾愈也秋冬陽氣下故宣疾發即擁疾愈也審此二者疾可理也又宜食者每間五六日空腹一食餅以精羊肉及黃雌雞為臠此可溫也若取下氣不食肉菜食者宜煮牛膝韭蔓菁又宜食雞子馬肉此物微擁亦可療宣疾也擁之過度便發脚氣猶如善為政者寬以濟猛猛以濟寬隨事制度使寬猛得所定之於心口不能言也又庸醫或令喫枯薑粉往往往經服之都無一效又每至樞熟之時取爛美者水淘去浮者食之下候心胸悶氣為度此亦甚佳生牛乳煖如人體渴即細細呷之亦佳張仲景云足太陽者是膀胱



尚德按足  
太以下至  
渴也仲景  
無此論

尚德按安  
略山某處  
四兩某處  
三兩桂枝

附子各一  
兩

家本知母  
十分字  
上有字  
餘字下  
及數分三

當家本作

宋本與才  
不二字  
宋本無舉  
之傷也四

之經也膀胱者是腎之腑也而小便數此為氣盛氣盛則消殺大便硬良則為消渴也男子消渴飲一斗水小便亦得一斗宜八味腎氣丸主之

神方消渴人宜常服之 乾地黄八兩 薯蕷四兩 茯苓三兩 山茱萸五兩 澤瀉四兩 牡丹皮 附子炮桂心各三兩 右

藥搗篩蜜和丸如梧子大酒下十九少少加以知為度忌猪肉冷水魚羹胡荽酢物生葱 師古今錄驗

必飲文仲  
方等並同

先服八味腎氣丸訖後服此藥壓之方 黃連二十 苦參粉 乾地黄各十 知母各八 牡蠣八分 麥門冬二十

分去 栝蠆無餘並同 右七味搗篩牛乳和為丸如梧子大餅手作丸暴乾油袋或用漿水或牛乳下

日再服二十丸一方服十五丸患重者渴差後更服一年以來此病特慎麋鹿肉須慎酒炙肉鹹物喫

索餅五日一頓細切精羊肉勿著脂飽食喫羊肉須著桑根白皮食一方云差後須服此丸一載以上

即永絕根源此病持忌房室熱麪并乾脯一切肉粳米飯李子等若覺熱渴加至二十五丸亦得定後還

依前減其方神效無比餘並準前方忌猪肉魚羹

將息禁忌論一首

夫人雖嘗服餌而不知養性之術亦難以長生養性之道不欲飽食便卧亦不宜終日久坐皆損壽也人欲小勞但莫久勞疲極也亦不可強所不能堪耳人不得每夜食食畢即須行步令稍暢而坐卧若食氣未消而傷風或醉卧當成積聚百疾或多霍亂令人暴吐又食欲得少而數不欲頓而多多即難消也能善養性者皆先候腹空積饑乃食先渴後飲不欲觸熱而飲飲酒傷多即速吐之為佳亦不可當風卧及得扇之皆令人病也才不逮而思之傷也悲畏懼悻傷也力所不勝而舉之傷也凡人冬不欲極溫夏不欲窮涼亦不欲露露星月下卧大寒大熱大風皆不用觸冒之五味入口不欲偏多偏多則損人腑臟故曰酸多即傷脾苦多即傷肺辛多即傷肝鹹多即傷心甘多即傷腎此是五行自然之理又傷初即不覺久乃損壽耳夫喫生肉膾必須日午前即良二味中其膾尤腥而冷也午後陰陽交錯人腹中亦順天時

偶宋本作  
呢

尚德按今  
有菜等二  
十六件

不成癰積亦能霍亂夫人至酉戌時後不要喫飯若冬月夜長性熱者須少食仍須溫軟喫訖須搖動令  
食消散即不能成脚氣凡衝熱有汗不用洗手面及漱口令人五臟乾枯少津液又冬夏月不用枕冷物  
石鐵尤損人木枕亦損人縱不損人及少年之時即眼暗也通按此條雖附消渴後不單言消渴也凡病  
與不病俱宜遵之從魚肉菜米豆等微此

飲魚肉等一十五件

羊肉甚補虛患風及脚氣不用喫偶食即生薑和煮又猪肉兔肉雞肉牛肉鱸馬肉大鯉鮎魚河魴等並  
禁不可食之鹿肉微冷少喫醬肉溫不可炙喫令人消渴久喫炙肉令人血不行野雞春月以後不堪喫  
鯽魚長六七寸以上並益人仍不要生喫生乾脯不可喫不消化為忌

飲菜等二十二件

凡冬瓜食之下氣唯脚氣相宜令人寒中不可多喫能下積年藥力甚損人久服令人虛壞筋骨萬甚令  
人寒中久食即骨頭生冷水令人髮鬢白蘭香胡荽芸薹三物不益人也甘菊枸杞菜發丹石少喫即溫  
多即冷紫蘇薄荷何徑葉水蘇溫中益人苜蓿白蒿牛蒡地黃苗甚益人長喫苜蓿雖微冷益人堪久服凡  
菜皆取熟喫不可生喫損人雖雞鶩不同五辛溫中補筋骨可食葱調諸侯但少喫無妨多食令人虛冷  
韭從二月以從青梢長者喫甚補至四月上旬止不可食從七月二十日從即漸堪喫至九月後冷兼有  
土氣蘿蔔消食下痰癖甚宜人生熟喫俱善斜蒿不甚益人亦與損蔓菁作齋令黃堪喫芥發熱動風傷  
筋骨蒜傷血損藥不可食寒性滑夏不堪食冬暴乾熟時煮用蘿蔔作齋下之利大小腸醋鹹並傷筋骨  
尤須節之不可縱性

飲米豆等九件

茶酒附子  
任意猶云稍  
通按少喫  
任意喫也

白米甚益人小豆菽豆白豆並動氣仍下津液少喫任意大豆甚下氣益人久服令人身重蕎麥不可食  
小麥麴喫之令人動熱不可頻食之大麥麴甚益人性小冷發癖氣粳米性寒南中溫茶不可多喫熱溫  
煮桑代之酒有熱毒漬地黃丹麥大豆即得飲之以上遠是問部方  
法亦一家說曾也



外臺祕要卷十一終

唐王素先生外臺祕要方卷十二目錄  
癰疽及瘰癧積聚癰疽  
胸痺奔豚三十八門

療癰方五首

癰結方三首

寒癰方五首

久癰方二首

癰癰瘡方二首

瘰癧方四首

尚德按今有方一十五首

瘰癧方三首

瘰癧及瘰癧不能食方一十四首

尚德按今有方一十五首

瘰癧等一切病方四首

瘰癧硬如石腹滿方二首

食不消成癰積方四首

心下如杯結癰方二首

尚德按今有方一十五首

癰癰瘰癧灸法四首

瘰癧方五首

瘰癧心腹脹滿方三首

瘰癧心腹脹滿方一首

瘰癧宿食寒熱方四首

瘰癧方三首

暴癰方六首

癰癰方四首

米癰方三首

食癰及魚肉成癰方二首

髮癰方二首

癰癰方一首

鼈癰方一首

蛇瘻方一首

蛟龍病方一首

胸痺方二首

胸痺短氣方三首

胸痺心下堅痞緩急方四首

胸痺噎塞方二首

胸痺欬唾短氣方四首

胸痺心痛方四首

胸痛方二首

奔豚氣方三首

奔豚氣衝心胸方四首

難治奔豚及結氣方六首

灸奔豚法六首

尚德按此字下疑脫氣字





唐王臺先生外臺秘要方卷十二

宋朝散大夫守光祿卿直祕閣判登聞鼓院上護軍臣林億等上進

新 安 後 學 程 衍 道 敬 通 父 訂 梓

瘰癧方五首

尚德按病  
源生字下  
有方字

病源夫五藏調和則榮衛氣理榮衛氣理則津液流通雖復多飲水漿亦不能為病若傷寒乘方則三焦痞隔三焦痞隔則腸胃不能宣行因飲水漿便令停滯不散更遇寒氣積聚而成瘰癧者謂解側在於兩脇之間有時而痛是也其湯熨鍼石別有正方稍養宣導令附於後養生云卧覺勿飲水更眠令人作水瀉又云飲水勿急咽久成水瀉又云舉兩膝夾兩頰邊兩手據地蹲坐故久之愈伏梁伏梁者宿食不消成瘰癧腹中如杯如盤宿癰者宿水宿氣瘰癧生癰久則腸化為筋骨變為實

廣濟療腹中瘰癧方 牛膝八分 桔梗 芍藥各六分 枳實八分 白朮六分 龍牙各八分 人參 厚朴各六分 黃 桂心 檳榔各六分 右十二味搗篩蜜和丸空肚溫酒服如梧子二十九日二服漸加至三十丸

老小微利忌生冷油膩小豆粘食蔥菜醋生蔥猪肉各二 千金翼江甯衍法師破瘰癧方 白朮 枳實 柴胡各三 右三味切以水五升者取二升分溫三服服

三十劑水差忌桃李雀肉出第十卷中 必效瘰癧方 取車下李人微湯過去皮及並人與乾麝相半搗之為餅如猶乾和淡水如常漫麝大小

一如病人手掌為二餅微炙使黃勿令至熟空肚食一枚當快利如不利更食一枚或飲熱粥汁即利

以快利為度至午後利不止即以醋飯止之利後當虛病未盡者量力一二日更進一服以病盡為限

小兒亦以意量之不得食酪及牛馬肉無不效但病重者率人與麝相半輕者以意減病減之後服者

亦任量力頓試差神效

又方 大黃附 右一味搗篩醋三升和煎調內白蜜兩匙煎堪丸如梧子一服三十丸以利為度小者

又方 大黃附 右一味搗篩醋三升和煎調內白蜜兩匙煎堪丸如梧子一服三十丸以利為度小者

又方 大黃附 右一味搗篩醋三升和煎調內白蜜兩匙煎堪丸如梧子一服三十丸以利為度小者

又方 大黃附 右一味搗篩醋三升和煎調內白蜜兩匙煎堪丸如梧子一服三十丸以利為度小者



減之

又方

牛黃三大麝香一當門硃砂準生犀角小黃許創未以上四味大黃吊藤升麻各一

甘草

龍甲半兩丁香五十右十味切以水三升先煮大黃等六味取強半升絞去滓內牛黃等四

味和絞分為三服每服如人行十里久忌如藥法若利出如桃膠肉醬等物是病出之候特忌牛馬肉

其藥及水並是大兩大升此藥分兩是十五以上人服若十歲以下斟量病減之忌蔥菜海藻松菜生

血物等

並出第三卷中

癖結方三首

病源此由飲水聚停不散復因飲食相搏致使結積在於脇下有時弦且起或脹痛或喘息短氣故云癖

結脈緊實者癖結也

出第二卷中

廣濟療癖結心下硬痛巴豆丸方 巴豆三枚去杏仁七枚去大黃如雞右三味搗篩大黃取巴豆杏仁

別搗如膏和大黃入蜜和丸空腹以飲服如梧子七丸日一服漸加以微利下病為度忌生冷油膩

中二卷

千金狼毒丸王堅癖方 狼毒五兩蜜半夏流杏仁各三桂心兩附子炮細辛各二椒三兩右七味搗

篩別搗杏仁蜜和飲服如大豆二丸

出第一卷中

救急中候黑丸療諸癖結痰飲等大良方 桔梗 桂心各四巴豆八分芫花十二分杏仁五分右五味先搗

三藥成末別搗巴豆杏仁如膏合和又搗二千杵下蜜又搗二千杵丸如胡豆漿服一丸取利可至二

三九兒生十日欲痢餘可與一二丸如黍米諸腹不快體中覺患便服之得一兩行利即好

九下之方得

出第三卷中

寒癖方五首

病源寒癖之為病是飲水停積脇下痠強是也因遇寒即痛所以謂之寒癖脈弦而大者寒癖也

尚德按千金蜀椒

出第二卷中

肘後瘰癧腹中冷癖水穀不結心下停痰兩脇痞滿按之鳴轉逆害飲食方 大蟾蜍一頭去皮及腹中物支解之芒硝

大人用一升中人七合小五合 右二味以水七升煮取四升溫服一升一時頓服一升若未下更服一升中人七

合藏小五合得下者止後九日十日一遍作之

又方 大黃三兩甘草二兩蜜二合棗二十枚 右四味切以水四升先煮三物取二升一合去滓內蜜再上

火煎令烊分再服忌海藻松菜

又方 巴豆三枚射杏仁二十枚桔梗六分藜蘆四分皂莢三分 右五味搗蜜和丸如胡豆末食服一九日三

欲下病者服二九長將服百日都好差忌猪肉蘆葦狸肉古今集驗同並

采師主久寒癖胸滿短氣心腹堅嘔吐手足逆冷時來時去痛不欲食食即為患心冷引腰背強急吳茱

萸丸方 吳茱萸八分附子三分厚朴五分半夏洗桂心 人參 礬石炙枳實炙乾薑各五分 右九味下篩

蜜和酒服如梧子二十九日三不知增之六卷中

延年白朮丸主宿冷癖氣因服熱藥發熱心驚虛悸下冷上熱不能食飲頓頭風旋暈嘔吐方 白朮六分

厚朴四分人參五分白芷三分橘皮四分防風五分吳茱萸 芍藥 薯蕷各四分茯苓五分桂心 大麥蘖煮乾薑

防葵各五分甘草五分 右十五味搗篩蜜和丸如梧子酒服十五丸日再加至二十九出第十卷中

久癖方二首

病源久癖因謂飲水過多水氣擁滯遇寒熱氣相搏便成癖在於兩脇下經久不差乃結聚成形段而起

按之乃水鳴積有歲年故云久癖出第二卷中

集驗瘰癧冷熱久癖實不能下虛滿如水狀方 前胡 生薑各四兩枳實三兩半夏四兩白朮三兩茯苓四兩甘

草又桂心各二兩 右八味切以水八升煮取三升分三服第六卷中

古今錄驗曹青丸療久寒積聚留飲宿食天行傷寒者服之二十日愈久服令人延年益壽殷仲堪云扁

鵲曾青丸療久癖積聚留飲宿食天行傷寒效逆消渴隨病所在久病羸瘦老小宜服藥或吐或下或汗

通接實不  
能下當是  
此食不能  
下  
尚德按能  
字下千金  
有飲食心  
三字外



出方 曾青分寒水石分朴硝分茯苓 大黃 附子分巴豆分 右七味各異搗下篩巴豆消相合  
 搗六千杵次內附子搗相得次內茯苓搗相得次內大黃搗相得次內曾青搗相得次內寒水石搗相  
 得次內蜜和搗千杵大人服大豆二九小兒五歲以下如麻子一九二三歲兒如黍米一九如服藥以  
 薄粉粥清下當覆卧令汗出吐下氣發作服二九霍亂服三九泄痢不止服一九可至二九一方用曾  
 青三分忌猪肉冷水蘆笋大酢崔氏同出第十卷中

癖癰瘡方二首

刪繁瘰癧風瘡膏酒方 猪肪膏升牛髓升油升薑汁 生地黃汁升當歸 蜀椒升吳茱萸合  
 桂心 人參分五味子分芎藭分乾地黄分遠志分皮分 右十四味切搗九味下篩為散取膏髓等  
 五種汁加水一斗同汁煎取水并藥汁俱盡但餘膏在停小冷下散攪令調火上煎三上三下燥器臍  
 凝冷為餅方寸以清酒一升煖下膏取服之晝兩服夜一服非但瘰癧亦主百病忌生葱薤  
 又枸杞子散方 枸杞子升乾薑 白朮分吳茱萸升蜀椒升橘皮升 右六味切搗五味三篩下  
 為散取枸杞子燥爇器臍研暴如作米粉法七日暴之一暴一研取前藥散和之又研隨飲酒食等即  
 便服一方寸匕和酒食進之如此能三年服非但瘰癧百病亦長陽氣並出第十卷中

瘰癧方四首

廣濟瘰癧瘰癧氣兩脇妨滿方 牛膝分桔梗 芍藥 枳實分人參分白朮 鼈甲 茯苓 訶梨勒  
 皮分柴胡分大黃分桂心分 右十二味搗篩蜜和丸如梧子空肚酒飲及薑湯任服二十九日二  
 服漸加至三十九利多即意減之常取微通洩為度忌生硬難消油膩等物及菹菜無入參出第二

中卷

千金翼瘰癧十年瘰癧方 桃仁 豉升蜀椒 乾薑分 右四味先搗桃仁如脂令搗千杵如乾可

尚德按合千金翼作

下少許蜜和搗令可丸空肚酒服三九如酸棗大日三本方下有製法此不

尚德按今  
有方十五  
首

分各八

疾黎子五各分訶

二十九日再漸

人參 前胡各二生

七八里久禁生葱

右四味切以水七

升者取二升五合去滓空肚分三服相去七八里久能連服三四劑始知驗禁生冷猪肉并毒魚大須

卷中

癖及瘰癧不能食方一十四首

牛膝六兩 生地黃九兩 當歸三兩 桂心四兩 茯苓六兩 遠志三兩

各三伏苓六兩一  
方三兩大麥藥末一升五  
合熱黃

右十二味搗篩為散空

腹溫酒服方寸匕日二服漸加至一匕半夏中百生薑及橘柳飲下加麥門冬六兩此方甚宜久服令

人參鹿茸牛肉生筋雞鬚等

崔氏療宿癖時腹微滿不能食調中五麥丸方  
人參 沙參 玄參 丹參 苦參 各一兩 大黃 四兩 附子



一兩巴豆四十枚蜀椒一斤乾薑半斤防風一盾蘇合一斤右十三味

先食服一丸日三忌猪肉蘆葦生血等物

又療癰飲并醋咽吐水及沫食飲不消氣逆脹滿方橘榔十兩高良薑三兩桃仁升右三味和搗絹篩以

白蜜和丸酒服如彈丸二枚日再服漸加至四五丸加減任意自量並出第

延年人參丸主瘧瘵氣不能食方人參八兩白朮枳實六分橘皮四分桂心七分甘草吳茱萸各五味搗篩蜜和為丸如梧子大一服十五丸酒下日二服加至二十九丸

又療冷氣兩肋脹滿瘵氣不能食方白朮三兩人參二兩茯苓枳實生薑各三桂梗二兩桂心半兩右

七味切以水八升煮取二升五合去滓分溫三服如人行七八里久

又桃仁丸主瘵瘵氣漫心脹滿不下食發即更脹連乳滿頭面閉悶致氣急者方桃仁八兩鬱甲吳茱萸枳實

白朮各六兩桂梗吳茱萸各五烏頭七分橘榔防葵各五芍藥四分乾薑五分紫苑細辛各四皂莢

二分去人參橘皮甘草四分右十七味搗篩蜜和丸如梧子服十九丸日再服加至二十九丸忌猪

肉苋菜等

又浸藥酒用下前藥方紫蘇牛膝丹參各三兩生薑六兩生地黃香豉各三兩紫苑三兩防風四兩橘皮三兩

大麻仁五合右十味細切絹袋盛以清酒二斗五升浸三宿後溫一盞用下桃仁丸酒盡更添三盞

又檳榔子丸主腹內瘵瘵氣滿胸背痛不能食日漸羸瘦四肢無力時時心驚方檳榔子六兩桂梗當

歸各四分人參五兩桂心前胡各四兩橘皮厚朴各三分白朮四分甘草五分烏頭乾薑各四兩鬱甲

五分大黃四分龍齒六分右十六味搗篩蜜和為丸如梧子大服十丸飲汁下日二服加至二十丸酒

下亦得忌醋貝菜生葱等

又療瘵癰胸背痛時時咳嗽不能食方桂心細辛各四兩白朮六兩厚朴三分附子乾薑各五兩橘皮分

又療瘵癰胸背痛時時咳嗽不能食方桂心細辛各四兩白朮六兩厚朴三分附子乾薑各五兩橘皮分

又療瘵癰胸背痛時時咳嗽不能食方桂心細辛各四兩白朮六兩厚朴三分附子乾薑各五兩橘皮分

又療瘵癰胸背痛時時咳嗽不能食方桂心細辛各四兩白朮六兩厚朴三分附子乾薑各五兩橘皮分

驚甲四分防葵吳茱萸各三右十味搗篩蜜和為丸如梧子大服十五丸酒下日二服加至二三

十丸忌蔥菜醋物生葱等

又療瘰癧發即兩肋攢急滿不能食方 檳榔子 枳實各六分桔梗 鼈甲各四分人參 白朮各六分桂心

三龍膽草五分前胡四分萎蕤 大黃各五分甘草六分右十二味搗篩蜜和為丸如梧子大服十丸酒下

日二服加至二十丸忌蔥菜生葱猪肉等

又半夏湯主腹內左肋瘰癧硬急氣滿不能食胸背痛者方 半夏三兩生薑四兩桔梗 吳茱萸各二兩前

胡 鼈甲各三兩枳實二兩人參 兩檳榔子十四枚右九味切以水九升煮取二升七合去滓分溫三服

如人行八九里久忌猪羊肉錫苋菜等

又療冷瘰癧氣發即瘰癧急引膀胱痛氣滿不消食桔梗丸方 桔梗 枳實 鼈甲 人參 當歸

各四分桂心三分白朮四分吳茱萸三分大麥六分乾薑四分甘草五分右十一味搗篩蜜和為丸如梧子大一服

十丸酒下日再服稍加至二十丸禁生葱猪肉苋菜等

又黃耆丸療風虛盜汗不能食腹內有瘰癧氣滿者方 黃耆五分白朮六分鼈甲五分白薇三分牡蠣四分茯苓

六分桂心三分乾薑 枳實四分橘皮三分當歸四分檳榔子 人參各六分前胡 附子四分右十五味搗

篩蜜和為丸如梧子大一服十五丸酒下日再服加至二十丸忌醋物猪肉冷水苋菜生葱並出第六卷中

必效練中丸主瘰癧虛熱兩脇下瘰癧惡不能食四肢酸弱口乾唾涕稠粘眼澀頭時時痛并氣衝背脾虛

腫大小便澀小腹痛熱衝頭髮落耳鳴彌至健忘服十日許記事如少時無禁忌方 大黃一斤朴硝十兩

芍藥八兩桂心四兩右四味搗篩蜜和為丸如梧子平旦酒服二十丸日再稍加至三十丸以利為度能

積服偏佳縱利不虛人神良忌生葱

又鼈甲丸主瘰癧氣發動不能食心腹脹滿或時發熱方 鼈甲八分白朮十分枳實八分芍藥六分麥門冬去心

人參各八分前胡 厚朴各六分右八味搗篩蜜和為丸如梧子飲服二十丸漸漸加至三十丸冷即酒

尚德按練  
疑當作練



外臺祕要

卷十二

癰疽等一切病方四首

服極效禁煎藥並出前二卷中

癰疽等一切病方四首

千金翼癰疽乃至癰脹滿方

烏牛尿升

右一味微火煎如稠糖空肚服大棗許一枚當鳴轉病出

隔日更服慎口味等

又三稜草煎主癰疽方

三稜草切一石

右一味水五石煮取一石去滓更煎取三斗汁銅器中重金煎

如稠糖出內密器中旦以酒一盞服一匕日二服每服常令酒氣相續並出第十卷中

崔氏療腹中癰疽兼虛執者不可用純冷專為藥宜羈縻攻之方

茱萸 防葵各八分 附子四分 右七味下篩蜜和為丸如梧子飲苦酒服十丸日再服漸漸加一丸以

微洩為度無所忌日晚服馬莧汁三四合以差為期亦是單煮煖此汁服前藥更佳馬齒菜即馬莧也

忌猪肉冷水今詳前方用龜甲不宜服莧菜云日晚服馬莧汁并服藥此必誤也出第七卷中

又溫白丸療癰疽塊等一切病方

紫苑 吳茱萸各三分 菖蒲 柴胡 厚朴 炙桔梗各二分 皂莢三分去

烏頭十分 茯苓 桂心 乾薑 黃連 蜀椒汗二分 巴豆一分 人參二分 右十五味合搗下篩和以白

蜜更搗二千杵丸如梧子一服二丸不知稍增至五丸以知為度心腹積聚久癰疽塊大如杯椀黃疸

宿食朝起嘔變支滿上氣時時腹脹心下堅結上來搶心傍攻兩脇微背連胸痛無常處繞臍絞痛狀

如蟲咬又癰十種水病八種痞塞反胃吐逆飯食噎塞或五淋五痔或九種心痛積年食不消化或婦

人不產或斷緒多年帶下淋瀝或疫癘連年不差又癰一切諸風身體頑痺不知痛癢或半身疼痛或

肩髮墮落又癰七十二種風亦癰三十六種通注或癰或痼或婦人五邪夢與鬼交通四肢沉重不能

飲食昏昏默默只欲取死終日憂愁情中不樂或恐或懼或悲或啼飲食無味月水不調真似懷孕連

年累月羸瘦困弊遂至於死或歌或哭為鬼所亂莫之知也但服此藥者莫不除愈臣知方驗便合藥

與婦人服之十日出癰疽蟲長二尺五寸三十餘枚下膿三升黑血一斗青黃汁五升所苦悉除當

尚德按若

方又見第

三十一卷

中分兩不

異同文亦不

下  
三  
人  
一  
舒便如石腹滿方肯  
食不肯成癰積方肯  
心下大如杯狀



即成出第十卷中

梧子二九日三不知稍加

堅心下大如杯食則腹滿心腹絞痛

右三味搗篩蜜和搗千杵服如

仍揅病上又塗布上

乾復易之取令消止

癰瘰疔氣灸法四首

崔氏療癰瘰肬方 令患人平坐取麻線一條繞項向前垂線頭至鳩尾橫截斷即迴線向後當脊取線窮頭即點記乃別橫度口吻吻外截却即取度吻線中摺於脊骨點處中心上下分之各點小兩頭通前合灸三處其所灸處日別灸七壯以上十壯以下滿十日即停看患人食稍得味即取線還度口吻於脊中點處橫分灸之其數一準前法仍有脊節穴去線一二分亦可就節穴下火如相去遠者不須就節穴若患人未損可停二十日外還依前灸之仍灸季肋頭二百壯其灸季肋早晚與灸脊上同時下火也

尚德按捐  
疑當作損

時下火也

尚德按背  
疑當作肩

又灸閃癖法 其癖有根其根有蒼背者有著膊上者遣所患人平坐熟看癖頭仍將手從癖頭向上尋之當有脈築築然向上細細尋之膊上至築築頭當膊即下火還與前壯數無別王云六背上恐不得過多下火只可細細目別七炷以來

又療癖左右相隨病灸法 第一屈頭近第二肋下即是灸處第二肋頭近第三肋下亦是灸處左右

各灸五十壯一時使了

千金云灸極熱左患左灸左患右灸右脊厥熱數第二肘上第三肘下向臍超前初日灸三次日五周而復始至五十止忌大醉餘不忘

又灸瘕氣法 從乳下即數至第三肋下共乳上下相當稍似近肉接腰骨外取穴孔即是灸處兩相俱

灸初下火各灸三壯明日四壯每日加一壯至六壯還從三壯起至三十日即罷 右前兩種灸法若

尚德按  
時點  
常作點  
舒時

點時拳脚點即拳脚矣若舒脚點時還舒脚矣  
七卷中

### 積聚方五首

病源積聚者由陰陽不和臟腑虛弱受於風邪搏於腑臟之氣所為也肺者陽也臟者陰也陽浮而初陰沉而伏積者陰氣五臟所生始發不離其部故上下有所窮已聚者陽氣六腑所成故無根本上下無所留止其痛無有常處諸藏受邪初未能為積聚留滯不去乃成積聚

肝之積名曰肥氣在左脇下如覆杯有頭足久不愈令人發瘧連歲月不已以季夏戊己日得之何以言之肝病當傳肝肝當傳脾脾季夏適王王者不受邪肝欲復還肺肺不肯受故留結為積故知肝之積以季夏戊己日得之也

心之積名曰伏梁起膈上大如臂上至心下以秋庚辛日得之何以言之腎病當傳心心當傳肺肺以秋適王王者不受邪心欲復還腎腎不肯受故留結為積故知伏梁以秋庚辛日得之也

脾之積名曰痞氣在胃管覆大如盤久不愈令人四肢不收發黃疸飲食不為肌膚以冬壬癸日得之何以言之肝病當傳脾脾當傳腎腎以冬適王王者不受邪脾欲復還肝肝不肯受故留結為積故知痞氣以冬壬癸日得之也

肺之積名曰息賁在右脇下覆大如杯久不愈令人洒淅寒熱喘咳發肺癰以春甲乙日得之何以言之心病當傳肺肺當傳肝肝以春適王王者不受邪肺欲復還心心不肯受故留結為積故知息賁以春甲乙日得之也

腎之積名曰瘕瘕於少腹上至心下若狹賁走之狀上下無時久不愈令人喘逆骨痿少氣以夏丙丁日得之何以言之脾病當傳腎腎當傳心心以夏適王王者不受邪腎欲復還脾脾不肯受故留結為積故知瘕瘕以夏丙丁日得之也此為五積診其脈快而緊積聚脈浮而牢積聚脈橫者脇下有積聚脈來

小沉實者胃中有積聚不下食食即吐出脈來細而附骨者積也脈出在左積在左脈出在右積在右脈



兩出積在中央以部處之診得肺積脈浮而毛按之辟易脇下氣逆背相引肩少氣善忘目瞋皮膚寒秋  
愈夏劇主皮中時痛如鉗緣狀其甚如鍼刺之狀時瘰白色也診得心積脈沉而乳時上下無常處病悸  
腹中熱面赤咽乾煩掌中熱甚即唾血主身瘕癥主血敗身差冬劇色赤也診得脾積脈浮大而長饑則  
減飽則見腹起與穀爭累累如桃李起見於外腹滿嘔泄腸鳴四肢重手足脛腫厥不能卧是主肌肉損  
色黃也診得肝積脈弦而細兩脇下痛邪走心下足脛寒脇痛引少腹男子積疝也女子病淋也身無膏  
澤喜轉筋爪甲枯黑春差秋劇色青也診得腎積脈沉而急苦脊與腰相引饑則見飽則減病腰痛少腹  
裏急口乾咽腫傷爛目瞋髑骨中寒主髓敗喜忘色黑也診得心腹積聚其脈牢強急者生脈虛弱急者  
死又積聚之脈實強者生沉者死其湯熨鍼石別有正方補養宣導今附於後養生方導引法云以左足  
踐右足上除心下積又云病心下積聚端坐柱腰向日仰頭徐以口內氣固而咽之三十過而止開目又  
云左脇側卧伸臂直脚以口內氣鼻吐之通而復始除積聚心下不便又云以左手按右脇舉右手極形  
除積及老血又云閉口微息正坐向王氣張鼻取氣逼置臍下小口微出十二通氣以除結聚低頭不息  
十二通以消飲食令人輕強行之冬月令人不寒又云端坐柱腰直上展兩臂仰兩手掌以鼻內氣閉之  
自極七息若曰蜀王橋除脇下積聚又云向晨去枕正偃卧伸臂脛瞑目閉口不息極張腹兩足再息頃  
間吸腹仰兩足倍拳欲息微定復為春三夏五秋七冬九瀉滌五藏津潤六腑所病皆愈腹有病積聚者  
張吸其腹熱乃止癥瘕散破即愈矣出第十卷中

范汪破積丸療積聚堅藏方 大黃斤牡蠣三凝水石 石膏 石鍾乳 理石各一 右六味搗合下  
篩和以蜜丸如梧子先食服酒飲任下三九日三不知稍增以知為度

又順逆丸主久寒積聚氣逆不能食方 大黃斤黃芩 厚朴炙 乾地黄 桂心 滑石各四 杏子二 黃  
連 麥門冬各 右九味搗合下篩和以蜜丸如梧子服十丸日再服後食不知稍增以知為度

忘真養生葱猪肉

又捶擊丸瘕腹中積聚邪氣寒熱消殺方 甘遂 芫花 芫花 桂心 巴豆 杏仁 桔梗各一

右七味芫花芫花熬令香巴豆杏仁去皮熬令變色已各異搗下細篩搗合丸以白蜜搗萬杵服如小

豆一丸日三行長將服之傷寒增服膈上吐膈下利小兒亦服婦人兼身亦服名曰捶擊以消息之忌

猪肉蘆筍生葱

並出第十卷中

延年療腹內積聚解氣衝心肋急滿時吐水不能食兼惡寒方 薤白 枳實 厚朴 當歸 附子 乾薑 防葵 人參 前胡 桔梗

右十五味檮歸蜜和為丸梧子大一服十五丸酒下日再服加至三十丸忌蘆薤諸肉生冷魚蒜

又白朮丸主積聚凝氣不能食心肋下滿四肢骨節酸疼盜汗不絕方 白朮 黃芩 牡蠣 人參 茯苓 烏頭 乾薑 芍藥 當歸 細辛 麥門冬 桂心 前胡 甘草 防葵

參 茯苓 烏頭 乾薑 芍藥 當歸 細辛 麥門冬 桂心 前胡 甘草 防葵

三龍甲 炙 紫苑 炙 積柳 分 桔梗 分 右十九味檮歸蜜和為丸空肚酒下二十丸日再加至三十

丸忌蘆薤棗桃李大醋猪肉生葱

並出第十卷中

積聚心腹痛方三首

病源積者陰氣五臟所生其痛不離其部故上下有所窮已聚者陽氣六腑所成故無根本上下無所留

止其痛無有常處此皆由寒氣搏於藏腑與陰陽氣相擊下上故心腹痛也診其寸口之脈沉而橫脇下

有積腹中有積積聚痛又寸口脈細沉滑者有積聚在脇下左右皆滿與背相引痛又云寸口脈緊而牢

者脇下腹中有積積結痛而泄痢脈微細者生浮者死

並出第十卷中

范汪通命丸療心腹積聚寒中疝痛又心胸滿脇下急繞臍痛方 大黃 遠志 黃耆 麻黃 附子 甘遂

鹿茸 各四兩 杏仁 各十枚 巴豆 五十粒 芒硝 三分 右十味搗合下篩和以蜜丸如小豆先食服三丸日再

忌蘆薤野猪肉

並出第十卷中

又療心腹積聚食苦不消胸脇滿除去五藏邪氣四物丸方 大戟 五苓 咀 芫花 杏仁 分 巴豆 百



七九下如清漆陳宿水婦人乳有餘疾留飲者下水之後養之勿飲冷水長壯者服五丸先食忌野豬

肉蘆笋出第十卷中右藥博合下細歸以雞子中黃亦可以蜜和丸如小豆日三日增一丸覺勿復益欲下頓服

古今錄驗勾奴露宿丸療心腹積聚膈上下有宿食留飲神方出備甘草三分大黃 甘遂 芫花 蘇大

戟 葶藶子二分苦參 硝石各一分巴豆半分右九味細博合蜜和丸如小豆服三丸當吐下不

吐下稍益至五六丸以知為度先少起忌海藻蘆笋松菜野豬肉范王同出第十卷中

積聚心腹脹滿方一首

病源積聚成病蘊結在內則氣行不宣通遂搏於臍臍故心腹脹滿則煩悶而短氣也出第十卷中

深師烏頭丸療心腹積聚脹滿少食多厥繞臍痛按之排手寒中有水上氣女人產後餘疾大人風癩少

小風驚癇百病者元嘉中用療數人皆良有一人服五服藥即出蟲長一尺餘三枚復出如牛膽黑堅四

枚中皆有飯食病即愈方 烏頭七枚乾薑 皂莢各五分子 葛蒲三分桂心四分柴胡 附子炮人參 厚

朴炙黃連 茯苓各三分蜀椒汗吳茱萸四分桔梗三分右十四味博篩蜜和為丸服如梧子二丸日三

稍加至十五丸忌豬肉冷水醋物生葱羊肉鴿出第十卷中

積聚宿食寒熱方四首

病源積聚而宿食不消者由臍臍為寒氣所來脾胃虛冷故不能消化留為宿食也診其脈來實心腹積

聚飲食不消胃中冷故也出第十卷中千金翼三台丸療五藏寒熱積聚臍脹腸鳴而噫食不作肌膚甚者嘔逆若傷寒寒瘧已愈今不復發食

後服五丸飲多者吞十丸長服令人大小便調和長肌肉方 大黃二兩熟硝石 葶藶各一升前胡二兩

補炙附子炮各一兩茯苓二兩半夏一兩杏仁一升去細辛一兩右十味博篩蜜和搗五千杵酒服如梧子五

丸稍加以知為度忌豬肉鴿生菜酢物出第十卷中

通按方內  
甘草味甘  
通草味甘  
疑是甘草  
尚德按甘  
皮即指皮  
說見第十  
卷中

古今錄驗氣瘡丸療寒氣瘡積聚結不通繞臍切痛腹中脹滿胸通滿厥入藏憂志所積用力不節筋脈

傷臍瘦不能食飲此藥令人強嗜食益氣力方 烏頭<sup>炮</sup>甘草<sup>炙</sup>葶藶子<sup>無</sup>大黃 芍藥 甘草

二分<sup>各</sup> 右七味下篩蜜和丸如梧子一服三九日再不知漸至五九七九一方桂心二分去甘皮忌海

藻菰菜猪肉冷水等<sup>一方有通草無甘皮</sup> 又小烏頭丸療久寒積聚心腹繞臍切痛食飲不下方 烏頭<sup>炮</sup>甘草<sup>炙</sup>各<sup>三兩</sup>葶藶子<sup>無</sup>半<sup>兩</sup>夏 附子

炮<sup>各二兩</sup> 右七味下篩蜜和丸如梧子大先食服五九日再不知稍增之忌羊猪肉冷水

又五通丸主積聚留飲宿食寒熱煩結長肌膚補不足方 椒目 附子<sup>炮</sup>厚朴<sup>炙</sup>各<sup>一兩</sup>杏仁<sup>三兩</sup>半<sup>兩</sup>夏<sup>一兩</sup>葶

藶<sup>三兩</sup>芒硝<sup>五兩</sup>大黃<sup>九兩</sup> 右八味搗草蕪子杏仁使熟和諸藥末和以蜜搗五千杵吞如梧子二九忌

猪羊肉錫冷水<sup>出第十卷中</sup> 療癥方三首

病源癥者由寒溫失節致臍藏之氣虛弱而食飲不消聚結在內漸染生長塊段盤牢不移動者是癥也

言其形狀可徵驗也若積引歲月人則柴瘦腹轉大遂至於死診其脈弦而伏其癥不轉動者必死<sup>出第十九</sup>

中卷 范汪療癥病丸方 射罔<sup>二兩</sup>蜀椒<sup>三兩</sup> 右二味搗末下細篩以雞子白和丸半如麻子半如赤小豆

先服如麻子漸服如赤小豆二九不知稍增之以知為度<sup>出第十卷中</sup>

集驗療心腹宿癥及卒得癥方 取雞雞一頭飼之令肥肥後餓二日以好赤米泔飯極令米多以飼雞

安雞著板上取糞暴燥末溫清酒服五分已可至方寸已日三若病困急者晝夜可五六服一雞少更

飼餘雞取足<sup>出第六卷中</sup>

備急射癥方 吳茱萸<sup>三</sup> 右一味以酒和煮熟布裹以熨癥上冷更炒更番用之癥移走逐熨都消乃

止也肘後方云亦可用射罔五兩茱萸末以雞子白和塗癥上<sup>出第三卷中</sup>

十卷 卷之十一 療癥方三首 癥癥方四首



尚德按本  
病源作盛

尚德按上  
肘後作止

暴厥方六首

病源暴厥者由藏氣虛弱食生冷之物藏既本弱不能消之積聚成塊卒然而起其生無漸名之暴厥也

本由藏弱其厥暴生至於成病死人則速出第十卷中

肘後療卒暴厥腹中有物堅如石痛如刺晝夜啼呼不療之百日死方 取牛膝根二斤以咀 右一味

酒一斗浸之密器中封口舉者熱灰中溫之令味出先食服五六合至一升以意量多少又用胡蘆根

亦準此大良千金集驗經心

又凡厥堅之起多以漸生而有覺便牢大者自難療也腹中微有結積便害飲食轉羸瘦療多用陷冰玉

壺八毒諸大藥今上取小小易得者方 取虎杖根勿令影臨水上者可得石餘淨洗乾之搗作末以秫

米五斗炊飯內攪之從少起日三亦佳此酒療厥乃勝諸大藥張仲文

搗千杵酒清飲之從少起日三亦佳此酒療厥乃勝諸大藥張仲文

又方 大黃半斤 朴硝三兩 蜜一斤 右三味合於湯上煎可丸如梧子服十九日三備急文仲崔氏同惟崔氏

二十九日再服餘依肘後並出第一卷中

千金翼療卒暴厥方 蒜十片 去皮五月 伏龍肝鴨卵大 桂心二尺 右三味合搗以淳苦酒和之如泥

塗著布上掩病處三日消肘後千金同凡蒜或無桂心亦得用也

又方 商陸根搗蒸之以新布藉腹上以藥鋪布上以衣覆冷即易服差止數日之中晨夕勿息千金集

同並出第十九卷中

古今錄驗療暴得厥方 取胡蘆根一小束淨洗漚去水細切以醇酒浸之取淹根三宿服五合至一升

日三若欲速得可於熱灰中溫令藥味出服之此方無毒已愈十六人神驗藥盡復作將服之出第十卷中

鼈厥方四首

病源鼈厥者謂腹內厥結如鼈之形狀也有食鼈觸冷不消而生瘕者有食雞冷物不消變化而作者此

尚德按與字與暗  
字下云黃  
蘭馬各切  
集韻食  
切韻食  
並音龍  
文笑也  
唐韻於  
切集韻  
並音厄  
篇韻與  
通主謂  
韻無啞字

皆脾胃氣弱而遇冷不能消化故也。藏者其病結成推之不動移是也。出第十卷中

廣濟療龍眼服白馬尿方 白馬尿一升五合溫服之令盡差

又方 白馬尿升雞子三枚破 右二味於鑊中煎取三合空腹服之不移時當吐出病無所忌。千金

又療龍眼蟹爪丸方 蟹爪三分 附子六分 麝香三分 半夏六分 生薑四分 龍甲炙 防葵各六分 郁李仁八分 右

八味搗篩蜜和為丸如梧子空肚以酒下二十九日再服以知為度忘生冷猪肉莧菜並出第

集驗療龍眼伏在心下手搗見頭足時時轉者并心腹宿癥及卒得癥方 白雌雞一隻絕食一宿明且

以膏封飯飼之取其尿無問多少以小便和之於銅器中火上熬令燥搗篩服方寸匕日四五服消盡

乃止常飼雞取屎差畢殺雞單食之。附後同出 第六卷中

米藏方二首

病原人有好啞米啞米按說文於筆切笑也集韻無此字但有訛轉久彌嗜啞之若不得米則胸中清水

出得米便止米不消化遂生癥結其人常思米而不能飲食久則斃人。出第十卷中

廣濟療米藏其疾常欲食米若不得米則胸中清水出方 雞屎升白米五合 右二味合炒取米焦搗篩

為散用水一升頓服取盡少時即吐吐出癥如研米汁碎若無癥即吐白沫痰水乃憎米不復食之無

所忌。千金 又療米藏久不瘳藏搜以至死方 葱白兩虎口切 烏梅三十枚碎 右二味以水三升宿漬烏梅使得極濃清晨

啜葱白隨葱白梅汁令盡頃之心腹煩欲吐即令出之三晨療之當吐去米藏差無所忌。並出第

食藏及魚肉成藏方二首

病源有人卒能大食乘其常分因饑值生葱便大食之乃吐一肉塊繞畔有口其病則愈故謂食癥持由

不幸致此此異成藏非飲食生冷過度之病也。出第十卷中

廣濟療食癥病食藏差方 有一人食飯七升并羊脂餅番不論數因於道中過饑急食生葱須臾吐出



有忌其日  
有飲之紀  
疑當作禁

尚德按并  
字下千金  
有備子

一寶壽而關統畔有口無數即以食投之立消盡飯七升乃止吐此物後其人食病便愈此名食癥無

忌出第二卷中

千金瘰癧食肉等成癥結在腹內并諸毒氣方 狗糞五 右一味燒灰末之綿裹以酒一斗清再宿瀝

取清分十服日三服三日令盡隨所食癥結即便出矣出第十卷中

### 髮癥方二首

病源有人因食飲內誤有頭髮隨食而入胃成癥胸喉間如有蟲下上來去者是也出第十卷中

廣濟瘰癧髮癥乃由人因食而入久即胸間如有蟲上下去來唯欲得飲油方 油升 右一味以香澤煎

之大鑊鑄之安病人頭邊以口鼻臨油上勿令得飲及傳之鼻面並令有香氣當叫喚取飲不得與

之必疲極眠睡其髮癥當從口出飲油人專守視之并石灰一裹見癥出以灰粉手捉癥抽出須臾抽

盡即是髮也初從腹出形如不流水中濃菜隨髮長短形亦如之無忌千金同

又瘰癧喉間覺有癥蟲上下偏聞葱豉食香此是髮蟲故也方 油煎葱豉令香二日不食張口而卧將

油葱豉置口邊蟲當漸出徐徐以物引去之無所忌出第二卷中

### 蟲癥方一首

病源人有多蟲性好蠶之所蠶既多而腑臟虛弱不能消之不幸變化生癥而患之者亦少俗云患蟲癥

人見蟲必蠶之不能禁止蟲生長在腹內時有從下部出亦斃人出第十卷中

千金瘰癧微由蟻蟲在腹生長為蟲癥方 故篋子 故梳子各一枚 右二味各破為兩分各取一分燒

### 蠃瘰方一首

病源蠃瘰者謂腹內瘰結如蠃狀是也有食蠃觸冷不消而生者亦有食諸雜冷物變化而作者皆由脾

胃氣弱而過冷即不能尅消所致瘰言假也謂其形假而推移也昔曾有人共奴俱患蠃瘰奴在前死遂

尚德松生  
字下病源  
有方字

尚德松黃  
字下金作  
茯苓

破其腹得一白蠃仍故活有人乘白馬來看此蠃白馬忽尿墮落蠃上即縮頭及脚尋以馬尿灌之即化為水其主曰吾將愈矣即服之果如其言得差故養生云六月勿食澤中水令人成蠃出第十卷中

崔氏療蠃瘕方 大黃六兩乾薑兩半附子炮人參各九兩側子半兩桂心六兩貝母半兩白朮一兩細辛十八兩麝香一兩

寸者七 右十味擣下篩以酒服半方寸匕日三忌猪肉冷水出第九卷中

### 蛇瘕方一首

病源人有食蛇不消因腹内生蛇瘕也亦有蛇之津液誤入飲食內亦令人病瘕其狀常若饑而食則不

下喉噎塞食至胸內即吐出其病在腹摸揣亦有蛇狀謂蛇瘕也出第十卷中

崔氏療蛇瘕大黃湯方 大黃半兩芒硝一兩烏鰂魚骨三兩黃芩半兩甘草一兩皂莢六枚如豬牙

六味咬咀以水六升煮之三沸下絞去滓內芒硝通寒溫盡服之十日一劑煮作如上法欲服之宿無

食平旦服當下病也千金同出第九卷中

### 蛟龍病方一首

病源蛟龍病者云二月八月蛟龍子生芹菜上有人食芹菜不幸隨入人腹變成蛟龍其病之狀發則如

癩出第十卷中

廣濟療蛟龍病三月八月近海及水邊因食生芹菜為蛟龍子生在芹菜上食入人腹變成龍子須慎之

其病發似癩面色青黃少腹脹狀如懷妊宜食寒食湯方 寒食粥湯三升日三服之吐出蛟龍有兩頭

及尾開皇六年又胃橋有人喫餚吐出蛟龍大驗無所忌千金方同出第二卷中

### 胸痺方二首

病源寒氣客於五藏六腑因虛而發上衝胸間則胸痺胸痺之候胸中悞悞如滿噎塞不利習習如蟻喉

裏澀唾燥甚者心裏強痞急痛肌肉苦痺絞急如刺不得俛仰胸前皮皆痛手不能犯胸滿短氣欬唾引

痛煩悶自汗出或徹背脅其脈浮而微者是也不治數日殺人其湯射鍼石別有正方補養宣導今附於



尚德按病  
源按地字  
尚德按要  
湯名入參

外臺秘要卷十二

胸痺短氣方三首  
胸痺中氣急方四首

後養生方云以右足踐地左足上除胸痺食熱嘔吐出第三卷中

仲景傷寒論療胸痺理中湯方 人參 甘草 炙白朮 乾薑各三兩 右四味切以水八升煮取三升去

滓溫服一升日三夜一頓服三劑愈仲景云胸痺心中痞堅留氣結於胸胸滿脇下逆氣捨心理中滿麻主之千金同出第十六卷中

深師療胸痺麝香散方 麝香四分 牛黃二分 生犀角一分 右三味研服五分已日三忌生冷物葱蒜出第十六卷中

中卷

胸痺短氣方三首

千金論曰夫脈當取太過與不及陽微陰弦即胸痺而痛所以然者責其極虛故也今陽虛知在上焦所

以胸痺心痛者以其脈陰弦故也平人無寒熱短氣不足以息者實也仲景傷寒論同胸痺之病喘息欬

唾胸背痛短氣其脈沉而遲關上小緊數者枯薑湯主之方 枯薑一枚 雞白斤半 夏半升 生薑四兩 枳實二兩

炙 右五味切以白截漿一斗煮取四升服一升日三肘後仲景傷寒論無生薑枳實半夏等三味同

小品云用水一斗忌羊肉錫

又胸中氣塞短氣茯苓湯主之方 茯苓三兩 甘草一兩 杏仁五十枚 右三味以咀咀以水一斗煮取五升溫

服一升日三服不差更合仲景傷寒論同並出第十卷中

深師療胸痺連背痛短氣細辛散方 細辛 乾地黃 甘草各二兩 桂心 茯苓各五兩 枳實炙 白朮 生

薑 枯薑實各三兩 右九味搗篩酒服方寸匕日三古今錄驗千金同出第十三卷中

胸痺心下堅痞緩急方四首

千金論胸痺之病令人心下堅痞急痛肌中苦痺緩急如刺不得俛仰其胸前皮皆痛手不得犯胸中幅

幅如滿咽塞習習瘰喉中乾燥時欲嘔吐胸滿短氣欬唾引痛煩悶自汗出或微引背臆痛不即瘳之數

日殺人出第十卷中

范汪療胸痺心中痞堅留氣結於胸中胸滿脇下逆氣搶心枳實湯方 陳枳實四枚 厚朴四兩 薤白八兩

尚德按要  
略名枳實

蘇白桂枝

桂心兩 栝蒌實一枚 右五味先以水五升煮栝蒌實厚朴取二升半去滓內餘藥又煎三兩沸去滓分溫

三服除心氣良

古今錄驗千金同此

古今錄驗療胸中隱熱而痛脊脅痛方 桂心 乾薑各一人參 細辛各三分 烏頭一分 山茱萸 目

母各三 右七味搗下篩和以蜜丸如小豆大酒若鵠汁吞二丸稍稍益以胸中痛止溫溫為度忘生

葱生菜猪肉冷水

又療胸痺偏緩急意以仁散方 薤白仁五百 附子十枚大 甘草三兩 右三味搗下篩服方寸匕日三

忌海藻松菜猪肉冷水

又療胸痺偏緩急意以仁散方 薤白仁一百枚 附子大者十枚也 右二味搗下篩服方寸匕日三不知稍

增之忌猪肉冷水

此方出備用范汪仲景方用薤白仁十五兩並出第八卷中

胸痺噎塞方二首

仲景傷寒論胸痺之病胸中幅幅如滿噎塞習習如癢喉中澀唾燥沫是也橘皮枳實湯主之方 橘皮

枳實四枚 生薑半斤 右三味切以水五升煮取二升分再服

千金通氣湯療胸滿短氣噎塞方 半夏八兩 生薑六兩 桂心三兩 吳茱萸四十枚 右四味切以水八升煮取

三升去滓分溫三服忌羊肉鵠生葱皮

此方無桂心用橘皮出第十三卷中

胸痺欬唾短氣方四首

仲景傷寒論胸痺之病喘息欬唾胸背痛短氣寸脈沉而遲關脈小緊數者栝蒌薤白白酒湯主之方

栝蒌實一枚 薤白半斤 右二味以白醇酒七升煮取二升去滓溫分再服

深師范汪同出第十五卷中

肘後論胸痺之病令人心中心堅痞急痛胸中苦痺絞急如刺不得俯仰其胸前及背脊痛手不得犯胸滿

短氣欬唾引痛煩悶自汗出或微引背脊不即瘳數日殺人療卒患胸痺方 雄黃 巴豆去皮 右二

味搗雄黃細篩內巴豆務熟搗之相和丸如小豆服一丸不覺稍益忘野猪肉蘆葦

尚德按此千金之方仲景無此論此方要略名橘枳實湯與上栝蒌薤白白酒湯同治備皮一斤枳實五枚通按成方再酢漿也釋米汁也尚德按要略上曰白酒無氣子



胸痺心痛方四首 賁氣方四首

又方 枳實 右一味 枳實以水汁先食服方寸匕日三夜一

又或已差復更於方 取薤根五 右一味 搗絞取汁飲之立愈 出第 一卷中

胸痺心痛方四首

仲景傷寒論胸痺不得卧心痛徹背者栝蒌薤白半夏白散漿湯主之方 大栝蒌一枚 薤白兩 半夏升

洗 右三味以白散漿一斗煮取四升去滓溫服一升日三忌羊肉鵠 古今錄驗同 范注 同出第十五卷中

千金療胸痺心痛方 炙臚中百壯穴在鳩尾上一寸 兩乳內開是忌 又療胸脇滿心痛方 炙期門隨年壯穴在第二肋端乳直下不容旁一寸半是 並出第十 卷中

古今錄驗小草丸療胸痺心痛逆氣膈中飲不下方 小草 桂心 蜀椒 汗各乾薑仁細辛三附子分

炮 右六味搗合下篩和以蜜丸如梧子大先食米汁服三九日三不知稍增以知為度忌猪肉冷水

生葱生菜 范注同出 第八卷中

胸痛方二首

范汪療胸痛枳實散方 枳實八分 桂心五 右二味搗下篩酒服方寸匕日三忌生葱 范注同

深師療胸痛枳實散方 枳實四枚 神麴 白朮各一 右三味搗篩酒服方寸匕日三忌桃李雀肉等

出第十 六卷中

賁氣方四首

病源夫賁氣者肝之積氣也起於驚恐憂思所生也若驚恐則傷神心藏神也憂思則傷志腎藏志也神

志動傷氣積於腎而氣上下遊走如飢之賁故曰賁其氣來心若心中踴踊如車所驚如人所恐五藏

不定食飲輒嘔氣滿胸中狂癡不定妄言妄見此驚恐奔賁之狀也若氣滿支心心下煩亂不欲聞人聲

休作有時乍差乍劇呼吸短氣手足厥逆內煩結痛溫溫欲嘔此憂思賁之狀也診其脈來祝視視

尚德按四 疑當作三

尚德按十 金無不答 旁三字

尚德按白 載數略 作白酒下 同

出第十 三卷中

外臺必效卷十二  
有飽氣衝心胸方咽  
津液令飽氣止方吞  
和



尚德按服  
字下疑脫  
尚德按湯  
字下疑脫  
湯字

尚德按切  
字下疑有  
脫字

皮八兩半夏七兩乾薑四兩茯苓三兩人參二兩甘草二兩附子一枚桂心四兩右八味切以水一斗煮取三升

絞去滓分三服別相去如人行六七里忌生冷羊肉錫海藻菜油醋物生薑粘食同

又療青豚氣在胸心迫滿支脇方 生薑一斤半夏四兩桂心三兩人參二兩甘草二兩右六味切

以水一斗煮取三升絞去滓分溫三服服別相去如人行六七里忌生蔥薤羊肉錫粘食海藻菜油同

同並出第  
四卷中

集驗育狔茯苓湯療短氣五藏不足寒氣厥逆腹脹滿氣育走衝胸脇發作氣欲絕不識人氣力羸瘦少

腹起膝踰如狔子走上走下馳往馳來寒熱拘引陰器手足逆冷或煩熱者方 茯苓四兩生薑一斤甘草二兩

炙生薑五兩半夏五升湯洗人參三兩當歸二兩芎藭各二兩李根白皮切右九味切以水一斗二升煮取五升服

一升日三夜二服忌羊肉錫海藻菜油等

又療育狔氣上衝胸腹痛往來寒熱育狔湯方 甘草二兩芎藭二兩當歸二兩半夏四兩黃芩三兩生薑五兩

藥三兩生薑四兩甘草根白皮切右九味切以水二斗煮取五升去滓溫服一升日三夜二服忌海藻菜油

菜羊肉錫等並出第  
四卷中

雜療奔狔氣及結氣方六首

深師療憂勞寒熱愁思及飲食隔塞虛勞內傷五藏絕傷無氣不能還下心中悸動不安七氣湯方 桔

梗二兩人參三兩方二兩一兩藥三兩柴胡七兩黃芩二兩乾地黄三兩枳實五枚桂心二兩乾薑三兩一兩甘

草三兩方一兩橘皮三兩半夏三兩方一兩一兩右十二味切以水一斗煮取三升去滓分三服忌海藻菜油羊

肉錫生葱猪肉薑黃等千金無桂心橘皮桔  
梗有厚朴括實對也

集驗療育狔氣從下上者湯方 生薑半斤五兩黃芩二兩桂心二兩芍藥三兩人參二兩生薑二兩甘草根白

皮切各一兩右八味切以水一斗五升煮取五升去滓溫分五服日三夜二服忌羊肉錫生葱出第  
四卷中

小品杜蠲育狔為療育狔氣從少腹起憶胸手足逆冷方 杜蠲三兩桂心二兩李根白皮一斤甘草三兩

右四味切以水一斗七升煮取李根皮得七升去滓肉餘藥再煮取三升分服五合日三夜再忘生葱

又療手足逆冷胸滿氣促從臍左右起鬱冒者奔豚湯方 甘草四兩 李根白皮切 葛根各一 黃芩三 桂

心 桔梗 人參各二 芎藭一 右八味切以水一斗五升煮取五升去滓溫服一升日三夜再忘海

藻松菜生葱 同范汪

又方桐君說 伏出雞卵殼中白皮 梨木灰 麻黃各 紫莞各 右四味擣下篩作丸散隨宜酒

服十九如梧子散者方寸匕療三十年喉中結氣欬逆豆差也亦可水煮為湯以意分之輕心錄同並

千金奔氣湯主火氣上奔胸膈中諸病每發時迫滿短氣不得卧劇者便渴欲死腹中冷濕氣腸鳴相逐

成結氣方 桂心五兩 薑一斤 人參三兩 夏洗 吳茱萸各一 甘草三兩 右六味切以水一斗煮取三升去

滓分為四服忌羊肉錫生葱海藻松菜 出第十 卷中

灸奔豚法 千金療奔豚腹腫法 灸章門一名長平二穴在大橫外直臍季肋端百壯

又主奔豚衝心不得息 灸中極一名玉泉在臍下四寸五十壯

又主奔豚上下腹中與腰相引痛者法 灸中府二穴在雲門下一寸乳上三肋間動脈是百壯一云百

五十壯

又主奔豚上下者法 灸四滿夾丹田旁相去三寸七壯

又主奔豚法 灸氣海在臍下一寸半百壯

又法 灸關元在臍下三寸五十壯亦可百壯並出第十 卷中

尚德按法  
字下疑脫  
六首二字  
尚德按息  
字下疑脫  
法字



外臺秘要方卷十二終

唐王壽先生外臺祕要方卷十三目錄

骨蒸傳屍鬼症  
鬼魅二十六門

虛勞骨蒸方七首

骨蒸方一十七首

火骨蒸法圖四首

瘵氣骨蒸方三首

虛損慘頰作骨蒸方四首

瘵病方五首

傳屍方四首

伏連方五首

飛尸方三首

遁尸方三首

五尸方一十一首

尸症方四首

五瘵方四首

江南九十九瘵方二首

江南三十六瘵方三首

瘵病相染易方三首

鬼瘵方二首

鬼瘵心腹痛方一首

鬼瘵羸瘦方二首

鬼氣方三首

鬼魅精魅方八首

鬼神交通方四首

白虎方五首

無辜方二首

除腎熱方四首

盜汗方七首

尚德按今  
有方二首





唐王壽先生外臺祕要方卷十三

宋軀散大夫守光祿卿直祕閣判登聞鼓院上護軍臣林億等上進

新安後學程行道敬通父訂梓

虛勞骨蒸方七首

病源夫蒸病有五一日骨蒸其根在腎旦起體涼日晚即熱煩躁寢不能安食都無味小便赤黃忽忽煩亂細喘無力腰疼兩足逆冷手心常熱蒸盛傷內即變為疳食人五藏二曰脉蒸其根在心日增煩悶擲手出足翕翕思水口唾白沫臥即浪言或驚恐不定脉數蒸盛之時或變為疳臍下悶或暴痢不止三曰皮蒸其根在肺必大喘鼻乾口中無水舌上白小便赤如血蒸盛之時胸滿或自稱得症熱兩脇下脈大致微背連脚疼眠寐不安或蒸毒傷藏口內唾血四曰肉蒸其根在脾體熱如火煩躁無汗心腹鼓脹食即欲嘔小便如血大便澀蒸盛之時或體腫目赤寢臥不安五曰內蒸亦名血蒸所以名內蒸者必外寒而內熱把手附骨而熱是其根在五藏六腑其人必困患後得之骨肉自消飲食無味或皮燥而無光蒸盛之時四肢漸細足跖腫起又有二十三蒸一胞蒸小便黃赤二玉房蒸男子則遺泄漏精女則月候不調三腦蒸頭眩悶熱四髓蒸髓沸熱五骨蒸齒黑六筋蒸甲焦七血蒸髮焦八脈蒸不調或急或緩脉九肝蒸眼累十心蒸舌乾十一脾蒸唇焦十二肺蒸鼻乾十三腎蒸兩耳焦十四膀胱蒸右耳偏焦十五膽蒸眼白失色十六胃蒸舌下痛十七小腸蒸下唇焦十八大腸蒸鼻右孔乾痛十九三焦蒸亦雜病乍熱乍寒二十肉蒸二十一膚蒸二十二皮蒸二十三氣蒸遍身氣熱凡諸蒸患多因熱病愈後食牛羊肉及肥膩或酒或房觸犯而成此疾久蒸不除多變成疳必須先防下部不得輕妄療之出第四卷中崔氏療五蒸夫蒸者是附骨熱毒之氣皆是死之端漸腐醫及田野之夫不識熱蒸體形狀妄注神祟以相疑惑蒸盛極變為疳而致死者不可勝記其蒸有五請略陳之

一曰骨蒸早起體涼日晚便熱煩躁不安食都無味小便赤黃忽忽煩亂細喘無力或時腰痛兩足逆冷



手心常熱蒸感傷內乃變成疳食人五藏若大便澀方可服芒硝一服一方寸匕日再服亦可搗苦參

蜜和為丸如梧子大一服七丸日再以飲送之無忌以體輕涼為度

二曰脈蒸其根在心日增煩悶擲手出足翕翕思水口唾白沫臥即浪語或驚恐不安其脈又數此蒸若

盛亦變為疳傍臍時悶或痢不止方 苦參 青箱各二兩 艾葉 甘草各一兩 右四味切以水四升煮取

一升半分為三分用羊胞盛之以葶灌下部中若不利取芒硝一方寸匕和冷水合和服之日再服忌

海藻松菜

三曰皮蒸其根在肺必大喘鼻乾口中無水舌上白小便赤如血蒸盛之時胸中滿悶或自稱得瘧手掩

兩脇不得大效微背連脚疼眠寐不安此蒸毒傷五藏口便唾血方 急與芒硝一兩以水一升半和分

為三服日三服止訖以冷水浸手以熨脇間及腋下并胸上及痛處亦可舉臂指灸側腋下第三肋間

腋下空中七壯立止

四曰肉蒸其根在脾體熱如火煩躁無汗心腹鼓脹食飲無味食訖便嘔小便如血大便秘澀蒸盛之時

或體腫目赤不得安寐方 大黃一兩半切如小豆大以水一升浸一宿明旦絞取汁一服五合許微利

即止若熱不定亦可服芒硝一方寸匕日三以體涼為度

五曰內蒸所以言內蒸者必外寒內熱把手附骨而熱也其根在五藏六腑之中其人必因患後得之骨

肉自消食飲無味或皮燥而無光蒸盛之時四肢漸細足跖腫起方 石膏十兩研如乳粉法水和服方

寸匕日再服以體涼為度出第七卷中

古今錄驗解五蒸湯方 甘草一兩 茯苓二兩 人參二兩 竹葉二兩 葛根 乾地黄各三兩 知母 黃芩各二兩 石膏

五兩 粳米一合 石十味切以水九升煮取二升半分為三服亦可以水三升煮小麥一升乃煮藥忌海

藻松菜無羹火醋范注同一方無甘草 紫苑 芍藥 大黃 黃芩 細辛各五 知母各四 礬石 欬各一

尚德殿  
以當作太

桂心分二 右十一味末之蜜和丸如梧子飲服十丸日二忌生葱生菜前出第五卷中

骨蒸方一十七首

廣濟療骨蒸肺氣每至日晚即惡寒壯熱頰色微赤不能下食日漸羸瘦方 生地黃三兩切 葱白切 香豉

甘草炙各三兩 童子小便升二 右五味切以地黃等於小便中浸一宿早晨煎兩沸絞取滓澄取一升二合

分溫二服服別相去如人行七八里服一劑差止不服已海藻松葉蕪荑豬肉油膩黏食等出第四卷中

崔氏療骨蒸以骨汁淋方 取枯朽骨碎遺微有土氣似有土氣則不差病 柳枝 刺棘針 桃枝各

斗三大 右四味以清水五大石煮之減半乃濾出汁別取清漿兩大石投釜中和骨重煮三兩沸然後

揔濾出淨拭釜取此前後湯相和更報復隨次取用使患者解髮令散以此湯發頂淋之其湯令熱但

不破肉為準一舉淋湯遺盡若覺心悶即啜三兩口冷飯如不能坐即臥淋淋湯之時自當大汗汗出

少處仍偏淋之務取汗勻以桂惡氣林訖可食一大碗熱葱豉粥仍暖覆取汗汗解以粉摩身連手足

使周徧思重者不過再淋欲重淋時量氣力淋此湯若飲之尤佳出第七卷中

文仲療骨蒸方 生地黃一升搗絞取汁三度搗絞始汁盡分再服若利即減之以身輕涼為度忌蕪荑

又療骨蒸苦熱瘦羸面目痿黃嘔逆上氣煩悶短氣喘急日晚便劇不能飲食若服生地黃汁即便服此

方 龍膽 黃連 栝婁 苦參 青桐 芍藥各一兩 梔子仁枚十 芒硝 大黃各二 黃芩分三 右十味搗

篩為散飲服一錢匕加至方寸匕日再大須慎生食若不禁生食不須服之忌猪肉冷水並作凡服之

藥味

又療骨蒸唇乾口燥欲得飲水止渴竹葉飲方 竹葉一握 麥門冬一升 大棗二十 甘草三兩 半夏一升 湯

煮梗米合生薑二兩 右七味切以水五升煮取二升半分溫三服忌羊肉鴈海藻菘菜

又方 麥門冬去心一升 小麥二升 枸杞根切三 右三味以水一斗煮取三升煮小麥熟去滓分溫日三服

又方 大烏梅二十枚 石膏六兩碎 右二味以水七升煮取四升去滓以蜜三合稍稍飲之佳



又方 患瘧瘵上於胸切下卒病必瘦脊骨自出以壯丈夫屈手頭指及中指夾患人脊骨從大椎向下

盡骨極指復向上來去十二三迴然以中指於兩畔處極彈之若是此病應彈處起作頭多可三十餘

頭即以墨點上記之取三指大青竹筒長寸半一頭留即無即頭削令薄似劍煮此筒子數沸及熱出

筒籠黑點處按之良久以刀彈破所角處又煮筒子重角之當出黃白赤水次有膿出亦有蟲出者數

數如此角之令惡物出盡乃即除當日明身輕也

又療骨蒸消渴消中熱中渴刺心熱心忪風虛熱傳屍等方 苦參一大斤黃連六知母 枯姜 麥門冬

心壯嘔各五大 右六味糖篩以生牛乳和併手捻為丸如梧子大暴乾一服二十丸稍稍加至三十

丸日再服飽食訖以漿水下如食熱麵酒加至五十丸忌猪肉冷水服急

又療骨蒸蒼梧道士方 紫菀 桔梗 續斷 青竹茹 五味子各三兩 桑根白皮五兩 甘草二兩 乾地黄

多者用赤小豆升 右九味切以水九升煮取三升五合分溫三服服五六劑十年者亦差每隔五日

一劑初發即服大驗勿輕之可煩服立驗蘇遊玄感論云王肺氣欬者相當餘同忌海藻松菜猪肉燕

又療骨蒸放出膿病重者方 皂莢一兩炙去 白鴿一兩炙去 生薑二分 右四味以酒一大升煮取

半升去滓先食飯然後服二合如人行三四里不吐更服二合又如人行二三里不吐抱服盡方便令

吐即膿出並出第

救急骨蒸之候男子因五勞七傷或因肺壅之後或為瘴癘之後宿患瘵癰婦人因產後虛勞漏汗寒熱

或為月閉不通無問男子婦人因夫行已後餘熱不除或為頻頻勞復小兒因癖其病並緣此十候所致

因茲漸漸瘦損初著盜汗盜汗以後即寒熱往來寒熱往來以後即漸加效效後面色白兩頰見赤如脂

脂色團團如錢許大左臥即右出唇口非常鮮赤若至鮮赤即極重十則七死三活若此以後加吐吐後

病百無一生不過一月死服此凡仍得不暮後人此病人急多是鬼鬼病治之方 青箱苗六月六日採 知母

黃連去毛大黃

梔子仁

枯礬

常山

姜莖各八分

苦參皮十二分

甘草

蜀漆洗各五分

右十一味搗篩

蜜和為丸如梧子大

飲服五丸

漸加至十五丸

日再服

以知為度

因至利忌

豬肉

薤蔥蒜

生菜海藻松菜

又療骨蒸方

毛桃仁一百二十粒去皮及雙仁留尖

右一味搗令可丸

平旦以井華水頓服

使盡服訖量性飲酒使

醉仍須喫水能多最精隔日又服一劑百日不得食肉

又療骨蒸極熱方

非其人莫服

取乾人糞燒令外黑

內水中澄清

每旦服一小升

薄晚後服小便一升

以差為限既常服不可朝朝取作大坑燒二升夜以水三升清之稍稍減服小便勿用自身者小兒者佳

又方用雄黃一大兩和小便一大升研令為粉乃取黃理石一枚方圓可一尺左側以炭火燒之三食

頃極熱灌雄黃汁於石上恐太熱不可近宜著一片薄覆置石上令患人脫衣坐上石冷停以衣被圍

遶身勿令藥氣洩出莫辭衣物具也凡經三五度如此必差

又療骨蒸傳屍方

皂莢長一尺者無相續取炙令微焦去黑皮碎之綿裏

黑錫大如雞子

羊肉大如拳煮如常法

右三味取一升無灰清

酒貯銅鑪內即著綿裏煎三五沸即瀉去綿裏即內黑錫使融液盡煎取三合令病者先啖肉汁即服

一合如變吐困不須起次以銅盆貯水令病人坐上有蟲麤如馬尾赤色頭黑即效如無以服三合盡

為度一服相去如人行十里必是得驗其禁食一如藥法並出第

必效骨蒸病小便方

取三歲童子小便五升煎取一大升以三匙蜜和為兩服中間如人行二十里服

此以後每日小便即取服之仍去前後取中夾者病輕者二十日病重者五十日二十日以後常有蟲

蚰蜒兒且蟲在身當處出俱令去人五步十步間病人小便臭者無不差台州丹仙觀張道士自服非

常神驗出第

灸胃法圖四首

崔氏列經灸胃法圖并序中書許西雅知神藥

夫含靈受氣稟之於五常攝生乖理降之以六疾至若岐黃廣記抑有舊經攻灸單行罕取今術骨蒸病

者亦在傳屍亦謂殭屍亦稱伏連亦曰無辜丈夫以辯氣為根婦人以血氣為本無問少長多染此疾嬰

而德被焉

疑當作神

灸胃法圖四首

三



補之流傳法更苦其為狀也髮乾而聳或聚或分或腹中有塊或體後近下兩邊有小結多者乃至五六  
或夜臥盜汗夢與鬼交通雖目視分明而四肢無力或上氣食少漸就沈羸縱延時日終於溘盡余昔忝  
洛州司馬常三十日灸活一十三人前後差者數過二百至如狸頭癩肝徒聞羸說金牙銅鼻罕見其能  
未若此方扶危拯急非止單攻骨蒸又別療氣癰風或瘰或勞或邪或癖患伏既廣救愈亦多不可具錄  
略陳梗概又恐傳授謬訛以誤將來今故具圖形狀庶令覽者易悉使所在流布頗用家藏未暇外請名  
醫傍求上藥還魂返魄何難之有通斯疾者可不務乎

灸骨蒸及邪但夢與鬼神交通無不差之法 使患人平身正立取一細繩令於脚下緊踏男左女右其繩前  
頭使與大姆指端齊後頭令當腳根後即引向上至曲胸中大橫文使截繩使斷又使患人解髮分兩邊  
使見分頭路仍平身正坐乃取向所截繩一頭與鼻端齊引向上路頭通過逐脊骨引繩向下盡繩頭即  
點著又別取小繩一頭與唇端齊合口處一頭向上至鼻底使截斷將此短小繩於前所點處中摺橫分  
兩邊兩頭各點記使與中央初點處正橫相當此小繩兩頭是灸處當脊初點者非灸處只借為度其點  
試却

又法 使患人平身正坐稍縮膊取一繩繞其項向前雙垂其鳩尾齊即截斷鳩尾是心岐骨人有無心  
岐骨者可從胸前兩岐骨下量取一寸即當鳩尾仍一倍翻繩向後取中屈處恰當喉骨其繩兩頭還雙  
垂當脊骨向下盡繩頭點著又別取一小繩令病人合口橫度兩吻便割斷還於脊上所點處橫分點如  
前其小繩兩頭是灸處長繩頭非灸處拭却以前摺通灸四處日別各灸七壯以上二七以下其四處並  
須滿二十壯未覺效可至百壯乃停候瘡欲差又取度兩吻小繩子當前雙垂繩頭所點處逐脊骨上下  
中分點兩頭如橫點法謂之四化此後點兩頭亦各灸百壯此灸法欲得取離日量度度訖即下火唯須  
三月三日人為佳瘡差百日以來不用雜食灸後一月許日患者若未好差便須報灸一如前法當即永

尚德按有  
時以下七  
字疑當在  
上文汗字  
下

通按種字  
可疑  
尚德按種  
猶樣也遠  
近一種者  
謂無廣據  
也

尚德按兩  
高字疑當  
作膈按三  
方疑當作  
方三首

張文仲說荊州人王元禮嘗家患骨蒸傳尸死盡有一道士忽教灸即斷兼更教人無有不差者欲識此  
病其病先乍寒乍熱有時唇赤或頰赤并有時崩血多唾有時欲得食有時不欲食兩脊脈常急患兒多  
欬盜汗以指按捻脊脊四邊肉有時心胸氣滿急黃羸脊中肉盡遂即著床如著床胸前自動脊脊兩邊  
肉盡灸療即難如灸候胸前肉動非事灸法如看病兒是病更不須選離日即預將艾去即將病兒於王  
道頭日午時灸灸七壯若先知其病又緩即取離日午時大吉欲灸覆病兒面向下著地取撮肋頭以病  
兒大姆指自捻著展中指直向脊骨指頭脊脊中肉少肋上點記從點記處向上至耳下尖頭即中央屈  
繩從初點處向上還當脊脊點繩所到記之又更再屈繩從元點記處向上還進前點記又以杖量取患  
兒中指頭兩折折斷還從元點記向下當脊脊點記一邊點四處兩邊俱點摠八處名頌去脊骨遠近一  
種並頌上下相當下從腋肋上至耳根取直其八處一時下火艾炷如棗核堅實作之灸了即以反三匝  
圍坐處便歸家不須迴顧禁肉新生冷時忌色及雜食平復後任依常未平復有犯重發即不可復療  
神素師灸骨蒸效法 當頭耳孔橫量相離三寸許相當灸有穴日灸三壯至第八日灸二七了第三椎  
上第二椎下男取左手女取右手頭指依兩指頭東西灸日上七壯至第八日各灸五十壯復五日灸  
各十五壯脰取繫鞋橫大文量至膝髁如亞下中分當脰骨外日灸一七壯滿第八日日灸滿三十五日  
了當脰上皆男左女右取頭指從腕文當指當頭灸日七壯至第八日滿百壯婦人肚脹月節不通取右  
手頭指當臍量至下腹當指頭灸日七滿三百壯高上午後灸高下午前灸

瘵氣骨蒸三方

廣濟療瘵氣心忪骨蒸熱間風鼈甲丸方 鼈甲炙芍藥 螻蛇脯炙大黃各八人參 訶梨勒皮熬枳

實炙防風各六 右八味搗篩為末蜜和丸如梧子以酒飲下二十九漸漸加至三十九日再服不利

忌芫菜生菜麵薺麥蒜粘食 出第二 大黃別漬湯洗成兩鼈甲炙釣藤 升麻 甘草炙各四 丁香湯洗成

備急療瘵瘵鬼氣症忤骨蒸秘驗方 大黃下四方四兩鼈甲炙釣藤 升麻 甘草炙各四 丁香湯洗成

下 瘵氣骨蒸三方 瘵氣骨蒸三方 瘵氣骨蒸三方 瘵氣骨蒸三方 瘵氣骨蒸三方 瘵氣骨蒸三方 瘵氣骨蒸三方 瘵氣骨蒸三方



右六味切以水七升煮取二升八合去滓分作三服又用牛黃犀角剉碎砂麝香各一細研分為三分每服以一分內湯中服經用多效特忌猪肉粘食生冷菹菜海藻松菜蘇遊同出第三卷中一方有薄荷二兩必效療瘧氣壯熱兼效久為骨蒸驗方 柴胡四兩 茯苓 白朮 枳實各三兩 右四味切以水七升煮取二升半分為三服積熱不歇即加芒硝六分取利熱除之後每三日服一劑差後每月一劑肥白終身永除忌桃李雀肉大醋出第二卷中

虛損慘頓作骨蒸方四首

張文仲療虛損慘頓不食四體勞強時翕翕熱無氣力作骨蒸候方 童子小便一大升淡 葱白各切

一杏仁四十枚去尖皮碎 右四味合煎取三分中分之二服使盡日別一劑服之至十劑愈若服經三四劑

覺四體益熱即服後方

又方 小便者一大升淡 葱白一合 豉抄一升薑一兩切 生地黃一握 右五味合煎六七沸絞取汁半升許分

為兩服或三服每服空腹服至二七日必差差後停三四日將息更服二七日神驗每服五六劑覺內

少冷即服前方二方以意斟酌間服常夜合浸頃久便即煎服至五更半令服了至欲明更服後丸服

訖至日出時不妨食至晚間未食更一服忌蕪羹

又方 人頭骨三大兩炙麝香一兩 右二味搗篩和蜜搗一千杵丸如梧子一服七丸日再服以粥飲送藥

若胸前有青脈出者以針刺看血色未變黑者服藥七日必差每日午時能更服後丸一服亦好藥既

無毒於事不妨

蘇遊療骨蒸肺痿煩躁不能食蘆根飲子方 蘆根切乾 麥門冬去心 地骨白皮 生薑各十兩 橘皮 茯苓

各五 右六味切以水二斗煮取八升絞去滓分溫五服服別相去八九里晝三服夜二服覆取汗

忌酢物未好差更作若兼服其人或胸中寒或直惡寒及虛脹并痛者加吳茱萸八兩

瘧病方五首

病源夫血氣者所以榮養其身也虛勞之人精髓萎竭血氣虛弱不能充盛肌膚故羸瘦也其湯熨針石別有正方補養宣導今附於後養生方云朝朝服玉泉使人丁壯有顏色去蟲而牢齒也玉泉口中唾也朝未起早漱口吞之輒琢齒二七過如此者三乃止名曰練精又云咽之三過乃止補養虛勞令人強壯

出第三卷中

廣濟療瘦病每日西即亦色脚手酸疼口乾壯熱鎖肝丸方 鎖肝六分 天靈蓋燒 生犀角屑 前胡升

麻各四 松脂五 枳實四 甘草五 分 右八味搗篩蜜和丸如梧子空腹以小便浸豉汁下二十九日

再不利忌海藻松菜生葱麵炙肉魚蒜粘食陳臭等物

又療瘦病方 天靈蓋一大 麝香一兩 桃仁一大抄 硃砂一兩 好鼓一大升 右五味各別搗篩訖然後

摠和令調每晨空腹以小便半升和散方寸匕一服差止不利忌生血物

又療腹脹瘦病不下食方 柴胡 茯苓各十分 枳實一兩 白朮 人參 麥門冬各六分 右七味

切以水六升煮取一升八合絞去滓分溫三服服別相去七八里喫一服不利忌生冷油膩小豆粘食

桃李醋物雀肉等

又知母丸主瘦病及久瘡黃等方 知母 常山各三 甘草炙 大黃 麻黃去節 黃芩 杏仁各二兩 蜀

漆洗 牡蠣各一 右九味搗篩蜜和丸如梧子空心服飲下七丸忌猪肉及葱酒麵服後心悶即吐是

此病出候不唾更漸加兩丸日與諸人服神驗非一忌海藻松菜生葱生菜等此方云是張文仲去英公處傳

救急瘦瘦疾方 甘草三兩 右每旦以小便者甘草三數沸頻服甚良忌海藻松菜卷第二

傳屍方四首

蘇遊論曰大都男女傳屍之候心胸滿悶背膊煩疼兩目精明四肢無力雖知欲臥睡常不著脊脊急痛膝脛酸疼多臥少起狀如佯病每至旦起即精神尚好欲似無病從日子以後即四體微熱面好顏色喜見人過常懷忿怒纔不稱意即欲嗔恚行立脚弱夜臥盜汗夢與鬼交通或見先亡或多驚悸有時氣急

尚德按吐  
疑當作吐  
疑當作吐



尚德按  
明疑當作  
肥

尚德按  
明疑當作  
膜

有時欬嗽雖思想飲食而不能多食死在須臾而精神尚好或兩肋虛脹或時微利鼻乾口燥常多粘唾  
有時唇赤有時欲睡漸就沈羸猶如水涸不覺其死矣

又論曰傳屍之疾本起於無端草間老少男女皆有斯疾大都此病相尅而生先內傳毒氣周徧五藏漸  
就羸瘦以至於死死訖復易家親一人故曰傳屍亦名轉注以其初得半臥半起號為殭殭氣急故者名  
曰肺痿骨髓中熱槓為骨蒸內傳五藏名之使連不解廢者乃至滅門假如男子因虛損得之名為勞極  
吳楚云淋瀝巴蜀云極勞其源先從腎起初受之氣兩腰酸疼腰脊拘急行立脚弱食飲減少兩耳颼颼  
欲似風聲夜臥夢洩陰汗痿弱腎既受已次傳於心心初受氣夜臥心驚或多忪悸心懸之氣呼吸欲盡  
夢見先亡有時盜汗食無滋味口內生瘡心常煩熱唯欲眠臥朝輕夕重兩頰口唇悉紅赤如傳脂又  
時手足五心皆熱心既受已次傳於肺肺初受氣時時欬嗽氣力微弱有時喘氣臥即更甚鼻口乾燥不  
聞香臭假令得聞唯覺朽腐物氣有時惡心憤憤欲吐肌膚枯燥或時刺痛或似蟲行乾皮細起狀若鼓  
片肺既受已次傳於肝肝初受氣兩目膜膜面無血色常欲顰眉視不及遠目常乾澀又時赤痛或復睛  
黃朝暮瞢瞢莫紅切瞢常欲合眼及至於臥睡還不著肝既受已次傳於脾脾初受氣兩肋虛脹食不消  
化又時渴利熱食生出有時肚痛腹脹雷鳴唇口焦乾或生瘡腫毛髮乾聳無有光潤或復上氣擡肩喘  
息利亦黑汁至此候者將死之證也

又論曰毒氣傳五藏候終不越此例但好候之百不失一

又論曰凡患癰瘕之人多成骨蒸不者即作水病仍須依癖法灸之兼服下水藥差

又論曰此病若脊腎肉消及兩臂飽肉消盡胸前骨出入即難療也若利赤黑汁兼上氣擡肩喘息皆為  
欲死之證也此是藏壞故爾

又論曰童女年未至十三以上月經未通與之交接其女目就消瘦而色痿黃不悟之者將為骨蒸因錯  
療之屢有死者有此輩者慎勿療之待月事通自當差矣

又論曰或有人偶得一方云療骨蒸不解尋究根本遂即輕用之主療既不相當病愈未知何日了不求諸鑒者唯知獨任己功若此之人寓目皆是至如以主肺痿骨蒸方將療症癖傳尸者斯乃更增其病豈有得痊之理何者主肺痿方中多是冷藥冷藥非症癖之所宜若用以療症癖此乃欲益反損非直病仍未差兼復更損其脾脾唯宜溫不合取冷如其傷冷脾氣即衰脾衰之證兩肋虛滿食既不消兼之下利如斯穿鑿欲益反損終莫能悟良可悲哉夫略舉一隅他皆倣此

又論曰凡患骨蒸之人坐臥居處不宜傷冷亦不得過熱冷甚則藥氣難通兼之脹滿食不消化或復氣上熱甚則血脈擁塞頭眩目疼唇乾口燥心胸煩悶渴欲飲水此等並是將息過度之狀深可誠也將養之法須寒溫得所先熱而脫先寒而著若骨傷冷即令飲嗽若手足傷熱即令心煩若覆衣傷厚即眠臥盜汗若覆衣過薄即心腹脹滿所是食飲不限時節宜可少食性無數數進之勢也必須傷軟易消不宜傷硬恐損胃氣此皆以意消息之為佳

又論曰主療之法先須究其根本考其患狀診其三部決其輕重量其可不與其湯藥指期取差若能如此方可措手先療其根次其末針灸湯散必須相應無容病根深遠少服即望痊除未及得瘳便復罷藥乃言藥病乖越似不相當如此懷疑余所不取亦有因瘳後作亦有因痢後為此病根其源非一略舉綱紀比類而取療之方法如後所言

又論曰骨蒸之病無閭男女特忌房室舉動勞作尤所不宜陳臭酸鹹粘食不消牛馬驢羊大小二豆猪魚油膩酒麵瓜菜野豬之屬葵葷蒜薤及生冷等並不得餐自非平復一月以後乃新開也大略如此觸類而長之此病宜食煮飯鹽豉豆醬燒薑葱韭枸杞苜蓿苦菜地黃牛膝葉並須煮爛食之俟病稍退思肌膚虛弱者可時食乾鹿脯為味中間所有得食之者按其條下具言之

廣濟療婦人腹內冷癖血塊虛脹月經不調瘦弱不能食無顏色狀如傳尸病方張文雞末 大麥藥末  
各二生地黄切大者白朮切大者牛膝切大者桑耳切大者各三升 薑黃切大者當歸切大者生薑切大者桃仁 杏仁 及雙仁



尚德按令  
疑當作令

若熟各二升 近用加橘皮而 右十二味並細切於臼中以木杵搗之如泥內瓶中以物蓋口封之勿令洩

氣蒸於一大石米中飯熟出之停屋下三日間出暴乾搗為散酒飲服方寸匕日二服漸加至一匕半

不利初服十日內忌生冷難消之物以助藥勢過十日外即百無所忌任意恣口食之唯忌桃李若須

桃李宜去水若不能放蜜丸服之亦得一服三十丸日二服去病令人能食肥健好顏色忌桃李雀肉

蕪美山第四

文仲論傳屍病亦名瘵瘵通注骨蒸伏連癭瘰此病多因臨屍哭泣屍氣入腹連綿或五年三年有能食

不作肌膚或二日五日若微勞即發大都頭頸骨間尋常微熱翕翕然死復家中更染一人如此乃至

滅門療之方 鵝肝一具破 豕野狸頭各一枚 紫莞四分 漢防已半兩 蜀漆洗 麥門冬去心甘草一兩 石

八味搗篩以成鍊羊腎脂二分合蜜一分烱冷和丸藥如梧子大服十丸加至十五丸日再以飲下

之其藥合和訖分一分頭邊著一分懸門額上一分繫臂上先服頭邊次服臂上次服門上者大驗忌

海藻松葉皂莢

又灸法 立脚於繫鞋處橫文以手四指於文上量腰骨外通脰當四指中節按之有小穴取一縷麻刮

令薄以此麻緩繫上灸令麻縷斷男左女右患多減

又方 青鈴羊肺一具破 布上散之於 苋子一合 醋各一 同漬經三日出各於布上暴之今至乾微火熬苋若

子各搗篩和以蜜丸如梧子服三丸加至四丸

又方地骨皮 白薇 芍藥 甘草 犀角 升麻 茯苓 麥門冬 黃芩 桔梗 枳實 大黃

前胡 茯苓 天門冬 生薑 桑根白皮 羚羊角 當歸 柴胡 礞砂 芫薺 鼈甲 蜀漆

知母 石膏 常山 烏梅 青豉 黃耆 地黃 橘皮 以上並可詳度病狀用之並出第

伏連方五首

廣濟療瘵病伏連傳尸鬼氣症忤惡氣方 斑貓去頭射干根各四分 石膽七分 桂心 牛黃各二分 犀角

尚德按十  
廷當作十

通按新綜  
一作新終

三分生人參二分石蚶湯一錢紫石七分別明蜈蚣四十麝香少許右十一味搗篩為散研相和每日空腹服一寸匕日三服用井華水二合溫即頓服勿臨喫與白米粥喫好覺小便澀好如含藥勿使婦人小兒難狗見忌熱麵菓子五辛酒肉生血生葱

又瘰癧病伏連辟諸瘰癧惡症硃砂方光明硃砂一大桃仁十枚去皮生麝香三分右三味研硃砂麝香令細末別搗桃仁如脂合和為丸如梧子其和不合以蜜少許合成訖清飲服一七丸日二服不利忌生血物並出第十卷中

崔氏斷伏連解法 先覓一不開口葫蘆埋入地取上離日開之煮取三匙脂粥內其中又剪紙錢財將向新塚上使病兒面向還道背塚坐以紙錢及新綜圓塚及病人使面別將少許紙錢圓外與五道將軍使人一手捉葫蘆一手於坐傍以一刀穿地即以葫蘆坐所穿地及生葫蘆了便一不病人捉兩個鐘拍病人背咒曰伏連伏連解伏連不解刀鐮解又咒曰生人持地上死鬼持地下生人死鬼即各異路呪訖令不病人即擲兩鐮於病人後必取二鐮相背不肯更取擲取相背止乃並還勿反顧又取離日令病人騎城外車轍面向城門以水三升反三重圍病人又作七個不翻餅與五道將軍咒曰天門開地戶開生人死鬼各異路今五離之日放捨即歸咒訖乃還莫回頭此法大良出第七卷中

文仲療伏連病本緣極熱氣相易相連不斷遂名伏連亦名骨蒸傳屍此用此方甚驗 人屎五大升人小便并新炊粟飲壯大六月六日齋半餅右四味取一瓷瓶盛蜜封置一室中二七日並消一無惡氣每旦服一大合盡二服無不差者合藥時潔淨燒香勿令婦人小兒女子雞犬孝子見之出第一卷中

延年桃奴湯主伏連鬼氣發即四肢無力日漸黃瘦乍好乍惡不能方 桃奴 苓苓各三鬼箭羽 芍藥 人參 橘皮各二生薑四檳榔七麝香一分右九味切以水九升煮取二升七合去滓內麝

溫分為三服如行八九里久忌大醋生冷五辛出第十卷中

飛尸方三首

飛尸方三首 通尸方三首

七



病源飛尸者發無由漸忽然而至若飛走之急疾故謂之飛尸其狀心腹刺痛氣息喘急脹滿上衝心胸

集驗療飛尸瓜蒂散方 瓜蒂 赤小豆各一握 雄黃二分 右三味搗下細篩一服五分乙稍增至半錢

乙以酪服藥廣濟療中惡心腹絞刺氣急脹 備急張仲景療飛尸走馬湯方 巴豆去心 杏仁去尖皮 右二物綿纏搥令極碎投熱湯二合指捻取

白汁便飲之食頃當下老小量服之通療鬼擊病忌野猪肉蘆薈此已見平疰中正療飛尸投不 古今錄驗附著散療飛尸在人皮中又名惡脈又名賊風發時急頭痛不在一處鍼灸則移發時一日半

日乃微差須臾復發皆療之方 細辛 天雄炮 莽草各一分 桂心一分 附子四分 雄黃二分 烏頭炮 乾薑各

分真珠研二分 右九味搗下篩服五分乙不知稍增當以好酒服之忌猪肉冷水生蔥生菜出第六

通尸方三首

病源通尸者言其停通在人肌肉血脉之間若卒有犯觸則發動亦令人心腹脹滿刺痛氣息喘急傍攻

兩脇上衝心胸差後復發停通不消故謂之通尸也出第二十

廣濟療初得通尸及五尸經年不差心腹短氣方 鶴骨三寸 羚羊鼻二枚 炙乾薑一兩 麝香二分 蜥蜴

炙斑貓十四枚 雞屎白三兩 巴豆五枚 皮去心 芫青二十枚 藜蘆一兩 右十味搗篩蜜和丸

空腹以飲服如小豆三九日二服稍加至六七九以知為度至吐利忌生冷油膩猪肉蒜粘食陳臭蘆

笋一方 無斑雞屎 白巴豆五枚 又初得通尸鬼症心腹中刺痛不可忍方 青木香 丁香各六分 鬼箭羽 桔梗 紫蘇 橘皮 當歸

各八生薑十二分 檳榔十四分 桃梟十四枚 右十味切以水九升煮取三升絞去滓分為三服日晚再

以快利為度忌如藥法並出第四卷中 桂心一尺 準乾薑三分 巴豆二枚 石三味合搗下篩以好苦酒和

集驗療通尸心腹刺痛不可忍方

集驗療通尸心腹刺痛不可忍方

集驗療通尸心腹刺痛不可忍方

集驗療通尸心腹刺痛不可忍方

集驗療通尸心腹刺痛不可忍方

之如泥以塗痛處燥即易之忌野猪肉蘆筴千金同用乾薑一兩出第一卷中

### 五尸方一十一首

肘後療卒中五尸五尸者飛尸遁尸風尸沈尸尸症也其狀皆腹痛脹急不得氣息上衝心胸傍攻兩脇或礪塊踊起或攣引腰脊今取一方而兼療之 搗蒺藜子蜜凡如胡豆服二九日三

又方 搗商陸根熬以薑盛之更番熨之冷復易

又方 粳米二升水六升煎二沸服之

又方 掘土作小坎以水滿坎中熟攪取汁飲之並出第一卷中

刪繁療五尸蠱症中惡客忤心腹刺痛丹砂丸方 丹砂研 乾薑 芎藭 羌活 烏頭各四分 芍藥 桂

心各八分 野葛皮三分 吳茱萸合 右九味搗篩蜜和為丸如大豆服三九日三清飲進之忌生血物猪

肉生葱子出第十卷中

備急療卒中五尸遁尸風尸飛尸尸症沈尸其狀皆腹痛脹急衝心攻脇或礪塊踊起或牽腰脊方 破

雞子一枚取白生吞之困者搖頭令下文仲附

又方舊氏法 雄黃 大蒜各一兩 右二味搗和取如彈丸內二合熱酒中服之須臾未差更服有尸疹者常

畜此藥用之驗文仲附

又方 乾薑 附子各一兩 桂心二分 巴豆三十枚去皮心注用 右四味搗篩蜜和又內白中搗萬杵服如小豆二丸

此藥無所不療忌野猪肉蘆筴生葱肘後同並出第一卷中

文仲療卒中五尸方 取屋四角茅內銅器中以三尺布覆腹著器布上燒茅令熱隨痛追逐踰下瘳便

差若瓦屋削四角柱燒用之神驗肘後同並出第一卷中

古今錄驗八毒赤凡療五尸蠱積及惡心痛蠱症鬼氣無所不療即是李子豫亦丸方出胡錄 雄黃研真

珠研麝石 雄石元裏砂 牡丹皮 巴豆去皮 附子 藜蘆各一兩 蜈蚣一校足 右八味搗篩蜜和丸服如小



豆二九日一極得吐下欲長將服者可或一丸忌猪肉狸肉蘆葦生血等物

又五尸丸療諸尸症方

芍藥 桂心各八分

吳茱萸 合丹砂

芎藭 烏頭炮

乾薑各四分

蜀椒一兩去汗

子仁分五 巴豆心皮去

右十味搗下篩蜜和丸如大豆一服三九日三忌猪肉生葱蘆葦生血等物

並七卷中胡洽有完化四分野葛皮二分為十二味

尸症方四首

病源尸症者即是五尸內之尸症而挾外鬼邪之氣流注身體令人寒熱淋瀝沈沈默默不知所苦而

無處不惡或腹痛脹滿喘急不得氣息上衝心胸傍攻兩脇或礮塊踊起或牽引腰脊或舉身沉重精神

雜錯常覺昏謬每節氣改變輒致大患積月累年漸就頭滯以至於死死後復易傍人乃至滅門以其尸

病症易傍人故曰尸症出第二十卷中

刪繁療尸症損鼻或聞哭聲或見尸常發死人席湯方 取死人眠席斬棺內餘棄路者一虎口長三寸

止一物以水三升煮取一升為一服立效出第十卷中

文仲療尸症方 取新布裹椒薄症上以熨斗火熨椒令出汗立驗

又姚氏方 燒髮灰 杏仁熟 鈴煉

右二味搗如脂以諸膏和酒服如梧子三九日三神良千金同

又鸛骨丸療尸症惡氣兼療百病方

鸛骨 炙桂心

各三錢

巴豆心皮去

斑貓十四枚去

足熱

右五味搗篩蜜和為丸如小豆一服二九日三服清飲進之忌野猪肉蘆葦生葱並出第一卷中

五疰方四首

病源注者住也言其連滯停住死又注易傍人也注病之狀或乍寒乍熱或皮膚淫躍或心腹脹刺痛或

支節沈重變狀多端而方云三十六種九十九種及此等五疰病皆不顯出其名大體與諸注皆同出第十卷

十四卷

刪繁五疰丸療中惡五疰尸入腹胸脇急痛鬼擊客忤停尸垂死者入喉即愈若已禁將物

強發開若不可發扣並折以灌下藥湯酒隨進之即效方 丹砂何雄黃研附子炮各甘遂半兩豉六十

巴豆六十枚去心右六味搗下篩巴豆別研令如脂乃更合搗取調白蜜和之藏以蜜器若有急疾

服胡豆二丸不覺更益以飲投之此藥多有所療殺鬼解毒破積去水良驗忌生血物猪肉蘆葦錄今

同出第  
九卷中

小品五症湯主卒中賊風遁尸鬼邪心腹刺痛大脹急方 大黃別清甘草二兩烏頭十枚炮生薑半

桂心兩四芍藥當歸各二蜜斤一右八味切以水九升煮取三升烏頭別內蜜中煎令得一升投著湯中

去滓分服三合如人行三十里又一服日三不知可至四合王尹威數用之忌海藻松菜猪肉生葱金十

同出第  
四卷中

古今錄驗五症丸一名神仙丸一名千金丸一名轉症丸一名司命丸一名殺鬼丸療萬病邪鬼在忤心

痛上氣厥夢蠱毒傷寒時疾痼癘方 丹砂研礞石泥裏燒雄黃研巴豆去心藜蘆熱附子二枚各蜈蚣一枚

足去 右七味搗篩蜜和丸如小豆服一丸日一即差不解夜半更服一丸定止帶一丸辟惡忌猪肉

冷水生血物狸肉出第七  
卷中

人五野丸療五症尸症哭症冷症寒症熱症在身體寒熱短氣兩脇下痛引背腰脊吸吸少氣不能行飲

食少面目痿黃小便難項強不得俛仰腹堅癰臍左右下雷鳴脹手足煩疼目不明喜忘久風濕痺腰脊

不隨喜夢驚百病皆療之方 牛黃研麝香研蜀椒去目雄黃研大黃當歸蜀烏頭炮蜀天雄炮硝

石熱一方用芒人參 桂心 硃砂 細辛 乾薑各二石蠅一巴豆五十枚去鬼白二分石十

七味搗篩蜜和丸如梧子服三丸日再不知稍增以知為度忌猪肉蘆葦生葱生菜生血物出第六  
卷中

江南九十九症方二首

集驗療江南症病凡有九十九種寒熱尸症此病隨月盛衰人有三百六十脈走入皮中或左或右或裏

或表如刀鋒所刺乍寒乍熱喉咽如鯁食如噎胸中痛繞臍苦痛食不知味腹中難以俛仰兩膝屈伸面



尚德按汗  
目發當汗  
目汗

通按本草  
無玉支一  
作玉泉或  
是  
尚德按玉  
交即羊脂  
獨異名綱  
目作枝者  
誤列錄主  
治邪氣鬼  
症毒至  
泉即玉泉  
不勝邪魁  
下同  
尚德按沈  
千金作就

或黃或青或白或黑至死更相注易方 取桑根白皮切三升暴燥作湯淋取汁浸小豆二升如此取汁

盡蒸豆熟作羊鹿肉羹噉此豆

出第一卷中

崔氏金牙散主邪魅心腹刺痛病狀與前方同

金牙研雄黃研丹砂研礬石泥裏燒寒水石 芫青熬

巴豆去皮心朴硝 桔梗 茯苓 人參 貫眾 附子炮蜀椒去汗露蜂房炙龍骨 乾薑 牡桂

烏頭炮石膏研莽草炙從蓉 大戟 芫花炙防風 狸骨炙商陸根 大黃 細辛 蛇蛻炙玉支

一作貝母 一作牙子 即銀牙也 右三十二味等分下篩酒服五分匕日三忌猪肉冷水生菜生血肉大醋蘆葦

集驗同出 第七卷中

### 江南三十六症方三首

崔氏金牙散療江南三十六症人病經年羸瘦垂死服之皆差并帶之能殺鬼氣逐尸症諸惡屬不祥悉

主之方治 金牙研曾青研硝石研礬石泥裏燒石膏研莽草 玉支一作氣雄黃硃砂研寒水石

龍骨 蛇蛻皮炙芫青熬當歸 龍膽 大黃 細辛 防風 大戟 芫花炙野葛炙從蓉 天雄

炮茯苓 附子炮烏喙炮乾薑 人參 桔梗 桂心 椒法目貫眾 巴豆去皮心狸骨炙蜂房炙鶴

骨炙 右三十六味搗篩為散以酒服一錢匕漸增五分匕日三并以三角絳囊貯散方寸匕以繫

頭及心上大良一方加蜈蚣蛇蜥蜴黃鱗鼻麝香毒公合四十二味忌猪肉生血物生菜冷水大醋蘆

戶 出第七卷中

備急療尸症鬼症者葛氏云即是五尸之中尸症又挾諸鬼邪為害也其病變動乃有三十六種至九十

九種大略令人寒熱沈沈嘿嘿不的知其所苦而無處不惡累年積月漸沈頓滯以至於死後復注易傍

人乃至滅門覺如此候者宜急療之方 獭肝具 右一味陰乾搗末水服一方寸匕日三如一具不差

更作姚氏云神良

又方 桑根白皮灰二升蒸令氣出下以釜湯三四升三遍重淋取二升漬赤小豆二升一宿出風乾復

漬汁盡止乃濕蒸令熟以羊肉或鹿肉作羹進此豆飯食一升漸至二三升重者七八升乃愈病去時體中覺疫癘淫淫或若根本不除重為之

肝後同並出第一卷中

疰病相染易方三首

深師療鬼物前亡轉相染夢寤紛紜羸瘦往來寒熱嘿煩悶欲寢復不能手足熱不能食或欲向壁悲涕或喜笑無常牛黃散方 牛黃<sup>研</sup> 鬼箭羽 王不留行 徐長卿<sup>一名石</sup> 遠志<sup>去</sup> 乾薑 附子<sup>炮</sup> 五味

子 石葦<sup>刮去黃皮</sup> 黃芩 茯苓<sup>各二</sup> 桂心<sup>一分</sup> 代赭<sup>三分</sup> 菖蒲<sup>四分</sup> 麥門冬<sup>去心</sup> 右十五味搗下篩以蜜生地

黃汁相拌合復令相得以酒服方寸匕日三忌猪肉冷水生葱羊肉錫醋物<sup>卷中</sup> 雄黃<sup>研</sup> 麥門冬<sup>去心</sup>

崔氏療江南三十六疰丸瘵轉疰滅門絕族族盡轉逐中外滅盡復易親友方 雄黃<sup>研</sup> 麥門冬<sup>去心</sup>

一<sup>方用</sup> 皂莢<sup>去皮</sup> 莽草<sup>各二分</sup> 鬼臼<sup>三分</sup> 巴豆<sup>去心</sup> 右六味搗篩蜜和為丸如小豆服二丸日一服忌

鯉魚野猪肉蘆葦

又赤丸療人久疰室家相傳乃至滅族方 雄黃<sup>研</sup> 馬目毒公<sup>也</sup> 丹砂<sup>研</sup> 莽草<sup>炙</sup> 藜蘆<sup>各二分</sup> 巴豆<sup>去心</sup>

皂莢<sup>去皮</sup> 真珠<sup>研各一兩</sup> 右八味搗篩蜜和丸如小豆一服二丸吐下惡蟲數十枚忌野猪肉蘆葦

生血物<sup>並出第七卷中</sup>

鬼疰方二首

病源注之言疰也言其連滯停住也人有先無他病忽被鬼排擊時或心腹刺痛或悶絕倒地如中惡之類其得差之後餘氣不歇停住積久有時發動連滯停住乃至於死死後注易傍人故謂之鬼疰也<sup>出第二十</sup>

四卷

古今錄驗神秘丸療鬼疰邪忤飛尸疰擊犬馬噬蜂蛇毒螫盡皆消除方 大黃<sup>四兩</sup> 硝石<sup>三兩</sup> 巴豆<sup>去心</sup>

雄黃<sup>二兩</sup> 右四味搗篩蜜和丸如小豆先食服二丸日一服忌野猪肉蘆葦<sup>卷中</sup>

崔氏蜀金牙散療鬼疰風邪鬼語尸疰或在脊脅流無常處不喜見人意志不定面目脫色目赤鼻張唇



焦瓜甲黃方

金牙

蜈蚣

蛇蝎

附子

人參

蛇蝎

徐長卿

雄黃

桂心

鬼白

野葛

毒公

苦薺

石長生

椒目

房多

曾青

真珠

丹砂

鬼督郵

烏頭

復毒

石膏

炙鵲骨

雷丸

乾漆

龜甲

狼牙

亭長

母貝

凝水石

鐵精

硝石

右四十五味

搗篩為散

先食酒服

一刀圭

日再不知

稍增之有蠱隨大小便出

也忌猪肉冷水生葱海藻菰菜生血物狸肉

出第七卷中

鬼症心腹痛方一首

古今錄驗還命千金丸療萬病心腹積聚堅結胸脅逆滿欬吐宿食不消中風鬼症入腹面目青黑不知

人方

雄黃

研兔白

徐長卿

礬石

研瓜丁

雌黃

乾薑

野葛

目汗

地膽

去翅

射肉

丹參

右十三味

搗篩蜜和搗

三十杵

丸如小豆先食服一丸日三不

知漸增以知為度若百毒所螫牛觸踐馬所踴噉癰腫瘰癧以一丸於掌中唾和塗痛上立愈正月旦

以椒酒率家中大小各服一丸終歲無病神良有驗秘不傳

出第六卷中

鬼症羸瘦方二首

古今錄驗黃帝護命千金丸療羸瘦歷年胸滿結疹飲食變吐宿食不下中風鬼症疾瘦方

斑貓

足翅

雄黃

研雌黃

鬼白

瓜丁

丹砂

研礬石

野葛

翅去足

右十二味搗下篩蜜和搗三十杵丸如梧子服五丸日二平中惡氣絕不知人服如小豆二

丸老小半之牛馬所觸踐癰腫若蠱毒所螫取一丸著掌中唾和塗瘡中毒上立愈正月旦以酒率家

中大小各一丸一歲不病若傷寒身熱服一丸若欲視病服一丸病者共臥不忍忌生血物

又犀角丸療百病鬼症惡風入人皮膚注淫液液流無常處四肢不仁牽引腰背腹脹滿心痛逆氣填胸

不得飲食噎膈氣寒熱羸瘦喜惡夢與鬼神交通熱欬唾膿血皆療之方

而能按燕  
毒疑當作  
毒疑各字  
下疑脫服  
字

為德按肉  
疑當作肉  
後同

犀角 桂心 各三 羚羊角

犀牛角 鬼白 附子 地 獺肝 二各 巴豆 三十枚 去 蜈蚣 四枚 去 麝香 真珠 雄黃 研 丹砂 研 各射

肉 一貝 龜 十個 右十五味 搗篩蜜和 搗五千杵 平旦服如胡豆二九日三慎生 蔥猪肉冷水蘆葭生

血等物 並出第 六卷中

鬼氣方三首

崔氏瘡鬼氣辟邪惡阿魏藥安凡香方 阿魏藥即涅盤經云央匱是也服法旦取棗許大研之為末又

取牛乳一大升煎之五六沸停令熟定取鴨子許大和攪服之更以餘乳盪盪飲之取盡至暮又取安

旦香亦如棗許大分如梧子還以熟牛乳服之令盡每日旦暮常然若無乳者即以煮肉汁服之患久

者不過十日近者不過五日如過三十日不愈便停只得食脯肉之屬但是一切菜不得近口持忌特

忌禮部孫侍即家中有此病所在訪問有人從梁漢來云官人百姓服此得效者十餘家孫侍即即令

依方進服七八日即效使以此法傳授親知得驗者非一余時任度支郎中欲廣其效故錄之 卷中

延年療鬼氣骨蒸氣日漸羸方 獺肝 十六人參 沙參 丹參 各三 鬼白 苦參 各二 右六味搗篩

蜜和凡如梧子大一服十九飲汁下日三服加至十九禁生冷猪魚肉生血等物

又五香丸主天行瘟疫惡氣熱毒心助氣滿脹急及疰鬼氣等方 香木香 犀角 屑 升麻 羚羊角 屑

黃芩 梔子仁 各六 沈香 丁香 薰陸香 各四 麝香 鬼白 各二 大黃 芒硝 各八 右十三味搗

篩蜜和丸如梧子一服三丸飲下日三服加至七丸以差止禁蒜麵猪魚 並出第十 一卷中

鬼魅精魅方八首

病源凡人為鬼物所魅則好悲而心自動或心亂如醉狂言驚怖向壁悲啼夢寐喜壓或與鬼神交通

病苦乍寒乍熱心腹滿短氣不能食此魅之所持也 出第二 卷中

廣濟療傳屍骨蒸痼痺肺痿疰忤鬼氣卒心痛霍亂吐瀉時氣鬼魅瘴瘧赤白暴痢瘵血月閉瘵癰丁腫

驚癰鬼忤中人吐乳狐魅吃力迎凡方 吃力迎 即白 光明砂 研 麝香 子 訶黎勒皮 香附子 中 沈香



重青木香 丁子香 安息香 白檀香 畢撥口上 犀角各一 薰陸香 蘇合香 龍腦香各半

石十五味神歸極細白蜜煎去沫和為丸每朝取并華水服如梧子四丸於淨器中研破服老小每碎一丸服之仍取一丸如彈丸蠟紙裏縫袋盛當心帶之一切邪鬼不敢近千金不傳冷水煖水臨時斟量忌生血肉臘月合之有神藏於密器中勿令洩氣出祕之忌生血物桃李雀肉青魚酢等

又療精魅病方 水銀兩一 右取水銀內蘗水一升炭火上煎三分減二即去火取水銀如熟豆大取當

日神行囊水銀空腹吞之晚又吞一服日三止無所忌並出第

肘後療卒中邪魅恍惚振慄之方 灸鼻下人中及兩手足大指爪甲本令艾丸半在爪上半在肉上各

七壯不止至十四壯便愈集驗同出

深師五邪丸療邪狂鬼魅妄言狂走恍惚不識人此為鬼魅當得殺鬼丸方 丹砂研 雄黃研 龍骨 馬

目毒公 鬼箭各五 鬼臼兩二 赤小豆兩三 芫青一枚 桃仁百枚去皮 右丸味擣下篩別研雄黃丹砂細絹

篩合諸藥拌令和調後內蠟和之大如彈丸絳囊盛之繫臂男左女右小兒繫頭合藥勿令婦人雞犬

見之所服蜜和丸如梧子一服三丸日三忌五辛生血物出第

小品療鬼魅四物驚頭散方 東海鳶頭是山 黃牙石又名 莨菪 防葵各一 右藥擣下篩以酒服方

寸匕欲令病人見鬼增防葵一分欲令知鬼主者復增一分立有驗防葵莨菪並令人迷惑恍惚如狂

不可多服備急千金同

集驗療男子得鬼魅欲死所見驚怖欲走時有休止皆邪氣所為不能自絕丸物牛黃丸方 荆實人精

曾青也阿 龍精 玉屑白虎精 牛黃土精 雄黃地精 空青天精 赤石脂精也 元參根也 龍骨水精也 各一兩凡九

物名曰九精上通九天下通九地 右擣下篩蜜和丸如小豆先食吞一丸日三稍加以知為度忌羊

血文仲 同出第

必效辟鬼魅方 虎爪 赤珠 雄黃 蟹爪 右四味擣令碎以松脂融及煖和為丸不然硬正朝旦

及有狐鬼處焚之甚效以熏人即神去王三師云奇效忌生血物

出第四卷中

近效大麝香丸療積年心痛尸疰蠱毒癰癰氣來心兩肋下有塊溫瘴精魅邪氣或悲或哭蛇蠍蜂等所

螫並療之方 麝香 牛黃 黎蘆 硃砂 蜀當歸 茯苓 桔梗 鬼箭羽 金牙 烏頭 桂心

吳茱萸 貫衆 丹參 蜈蚣 乾薑 人參 虎骨 鬼白 芍藥 雄黃 路半巴豆

心皮 蛇蝎 半枚 分各一 蜈蚣 去足 乾薑 人參 虎骨 各二 鬼白 半斤 芍藥 雄黃 各半 巴豆 二十

三兩行後冷醋飲止之即定然後煮葱食之勿食冷水明日依前服之永差忌熱麵生菜柿子梨等蛇蠍

蜂螫取一丸研破和醋塗之便差精鬼狐狸之屬拋磚瓦或如兵馬行夜發者是鬼魅無早晚每日服

前藥兩丸只三兩日服即差仍每日燒一丸熏身體及衣裳宅中燒之亦好無患人以三五丸緋絹袋

盛繫左肩上辟虎毒蛇諸精鬼魅等忌狸肉食血物猪肉生葱蘆笋

### 鬼神交通方四首

崔氏療夢與鬼神交通及狐狸精魅等方 野狐鼻 豹鼻 狐頭骨 雄黃 膈臍 鬼箭羽

露蜂房 白朮 虎頭骨 阿魏 藥 驢馬狗馳牛等毛 如死人體骨 一兩 又 石十五味並

大祥兩搗篩為散攪使調勻又先以水煮松脂候候接取以和散和散之時勿以手攪將虎爪攪和為

丸如彈丸以熏患者欲熏之時蓋覆衣被勿令藥煙洩外別搗雄黃為末以藉藥燒藥節度一如熏香

法其藥欲分於牀下燒熏彌善忌桃李雀肉等

出第七卷中

備急陶氏療女人與鬼物交通獨言笑或悲思恍惚方 松脂 內雄黃末 右二味用虎爪攪令

調丸如彈丸夜內籠中燒之令女裸坐籠上被急自蒙唯出頭耳過三熏即斷

又方 雄黃 人參 防風 五味子 右四味為散早以井華水服方寸匕日三服

又若男女夢鬼通致恍惚者方 鹿角屑 酒服三撮日三

並出第三卷中

### 白虎方五首



尚德按廣濟以下六字疑當揭書

尚德按瓜疑當作瓜茲錄竹杓

卷之十三 無辜方二首

近效論白虎病者大都是風寒暑濕之毒因虛所致將攝失理受此風邪經脈結滯血氣不行蓄於骨節之間或在四肢肉色不變其疾書靜而夜發發即徹髓酸疼乍歇其病如虎之嗜故名曰白虎之病也廣濟療白虎方 犀角 屑當歸 芍藥 各六分 牛膝 沉香 青木香 虎頭骨 炙 各一分 槲葉 炙 一握 右八味切以水六升煮取二升六合去滓分溫三服如人行四五里進一服別加麝香末服之不利忌生菜麵薺等物 此第四卷中

蘇孝慈療白虎病云婦人丈夫皆有此病婦人因產犯之丈夫眠臥犯之為犯白虎爾其病口噤手拳氣不出方 灸臍中七壯 一云灸臍中七壯

近效療白虎方 炭反得妙羅羅之一過 蛭蜋 薑 一升 紅藍花 一升 右三味一處攪和熬令熟取好臘

醋煖之拌令泥泥以故布三四重裏分作四分更番當所患痛處熨之數數轉勿住手按之冷熱得所

留令小熱不得作冷冷即復熱令熱又熨之並用後咒法曰青儂皮青毛出黃儂皮黃毛出赤儂皮赤毛出白儂皮白毛出黑儂皮黑毛出急出吾口神吾口聖唾山山崩唾石石裂得汝字汝不出斫頭斫

頭急急如律令其咒法先令人唾痛處以手按之不住手便即誦此咒不限遍數以差即停當誦咒不得令病人及傍人聞咒須先淨漱口潔淨良效無比千金勿傳

又療風毒腫一切惡腫白虎病並差方 取三年臘醋五升熱煎三五沸切葱白三二升煮一沸許即爪雞瀉出布帛熱裏當病上熨之以差為度

又療白虎方 猪肉 三斤 大麻子 一合 酒 一斗 右三味和麻子口含喫上將猪肉三串手擘向痛處來去咒曰相州張如意張得咒是汝白虎本師急出咒訖將肉安牀下差送路頭神驗

無辜方二首 崔氏無辜閃辟或頭就癰癰頭髮黃簪分去或乍痢下差諸狀既多不可備說大黃煎丸方 大黃 九兩

新實者若微巧即不 右一味搗師為散以上好米醋三升和之置銅椀內於大鑊中浮湯上炭火煮

尚德按今  
有方五首

之火不用猛又以竹木篾攪藥候堪丸乃停於小瓷器中密貯兒年三歲一服七丸如梧子日再服常  
以下青赤膿為度若不下膿或下膿少者稍稍加丸下膿若多丸又須減病重者或至七八劑方盡根  
本大人小兒不等以意量之此藥唯下膿及宿結不令兒痢禁牛馬驢雞猪魚兔肉生冷粘滑油膩小  
豆蕎麥乳母亦同此忌

又療無辜腦後兩畔有小結者方

無辜之病此結為根欲療者先看結之大小然後取細竹剉斷龍得

此結便截竹使斷狀如指環形仍將此竹籠結自然不得轉動以火針針結子中央作兩下去針訖乃  
塗少許膏藥無者雜油亦得須待三兩日又如前報針更經一兩日當膿水自出若不出復如前針候  
膿潰盡結便自散俗法多用刀子頭割者謂之割無辜此來參詳殊不如針之以絕根本恐患者不悉  
故復重說之並出第七卷中

除骨熱方四首

范汪療骨熱狸骨丸方

狸骨連翹各五土瓜 山茱萸 元參 胡鷄屎 黃芩 丹砂 馬目毒

公

鳶尾各二黃連 芍藥 雄黃 青箱子 龍膽 枯蓼各三

右十六味搗篩蜜和丸如梧子

先食服三丸日三不知稍稍增之以知為度禁食生魚菜猪肉黃黍米生血物古今錄

古今錄驗除熱三黃丸療骨蒸熱身多瘡癰癰腫者方

大黃 黃芩 黃連 當歸 茯苓 桂心

乾薑 芍藥

各二梔子各一十四柴胡各三

右十味搗篩蜜和丸先食服如小豆三丸不知增至十丸欲

取微利以意增之久服益良忌生葱醋物猪肉冷水

又方

大黃 黃連 黃芩各一芒硝各二 右四味搗篩蜜和為丸一服五丸漸加以知為度忌猪肉冷

水

並出第四卷中

盜汗方七首

病源盜汗者因眠睡而身體流汗也此由陽虛所致久不已令人羸瘠枯瘦心氣不足亡津液故也診其



尚德按李時珍本草麻黃根附方治小兒盜汗引之無仍又以作仍字以

脈男子平人脈虛弱細微皆為盜汗脈也

出第三卷中

崔氏療盜汗夜睡中即汗汗不休必得風方

麻黃根切小麥

各二

右二味以水一斗二升煮小麥得

九升內麻黃根煮之得三升去滓分為三服常夜服之不過兩劑即止

又方 甘皮

薑各一兩

杏仁三兩去尖皮熬

當歸四兩

右四味搗合蜜和丸服如梧子五丸漸漸增之

又方

取死人席緣燒作灰淋汁熱洗從頭至足愈

又止汗粉方

宋規

麻黃根

牡蠣粉

敗扇灰

桔萸

各三兩

白朮

二兩

米粉

三升

散和粉攪令調以生絹袋盛用粉身體日三兩度忌桃李雀肉仍炙大椎五六百炷日灸二七五七任

意不能日別灸亦得汗即漸止

並出第三卷中

延年主盜汗夜臥床席衣被並濕方

麻黃根

牡蠣

碎之綿裹

黃耆

人參

各二兩

枸杞根

白皮

打碎各四兩

大棗

七枚

右七味切以水六升煮取二升五合去滓分溫六服如人行八九里久中間任食

一日令盡禁蒜麵等物

又療夜臥盜汗方

左顧牡蠣

黃耆

各三兩

麻黃根

五兩

杜仲

二兩

右四味搗篩為散一服方寸匕日三夜

一服用敗蒲扇煮取汁下藥禁蒜麵

並出第三卷中

古今錄驗療盜汗麻黃散方

麻黃根

分三

故扇


燒屑一分

右二味搗下篩以乳服三分仍日三大人方寸匕

日三不知益之又以乾薑三分粉三分搗合以粉粉之大善

並出第三卷中







W 2467 w

1915

V. 11-13